لآلى فى أمراض الروماتيزم
PEARLS IN RHEUMATOLOGY

د مهىء أبوكرشة ★

أخصائى أمراض المفاصل والروماتيزم

٩/أيار/٢٠١٧

في الجراحة

- مرضى RA والذين يحتاجون لعمل جراحي يتطلب تخدير عام يجب اجراء صورة رقبة بفرط العطف والبسط لنفي تحت الخلع الفهقي السني (يجب عدم اجراء فرط بسط عند التنبيب)
- لم تثبت فائدة الصادات الوقائية ، يجب الانتباه للتعقيم الجيد للقناطر ومكان حقنها و وضع الصادات الموضعية مكان ادخال القناطر الوريدية أو البولية ويجب عدم إعطاء الحقن العضلية بسبب خطورة حدوث خراج الإلية
- تقييم وظيفة الكلية كل ٨ ساعات أول ٤٨ ساعة ثم يوميا لمدة أسبوع
- ويجب الانتباه لخطورة الخثار المرتفعة ويفضل إعطاء تمييع وقائي بعد ٦ ساعات من الجراحة

الأدوية والجراحة

- المريض الذي يأخذ ستيرويدات بشكل مزمن وبحاجة لعمل جراحي متوسط أو كبير نعطي ١٠٠ ملغ هيدروكورتيزون عند تحريض التخدير ثم ٥٠ ملغ كل ٨ ساعات لمدة يومان
- المريض الذي يأخذ كلوروكين لا تدبير خاص
- أضداد ال TNF (العلاج البيولوجي) يوقف قبل ٤ أسابيع
- الميتوتركسات لا يزيد خطورة الإنتان بجرعات أمراض الروماتيزم ولكن يفضل إيقافه لجرعة واحدة قبل الجراحة
- السيكلوفوسفاميد (الإندوكسان) يوقف قبل ٣ أشهر في حال استقرار المريض ، وفي الحالات الاضطرارية قبل شهر بسبب خطورة الإنتان المرتفعة

الآلئ

• لا تطلب من المريض أبدا إيقاف كافة الأدوية بشكل مفاجئ

• الهجمة المفصلية الشديدة بعد الجراحة قد تسبب آثار ضارة جدا على نتائج العمل الجراحي

• يفضل اجراء استشارة مفصلية لكل مريض روماتيزم يعالج بمثبطات المناعة وبحاجة لعمل جراحي
يتطلب تخدير عام

ليس كل ارتفاع ASLO هو حمى رثوية

معايير تشخيص الحمى الرثوية:

معايير كبيرة :

- ١- التهاب مفاصل عديد هاجر: التهاب المفصل يجب أن يستمر عدة أيام وليس أكثر من أسبوع لكل هجمة ويستجيب بشكل وافي ل NSAIDS
- ٢- التهاب قلب
- ٣- حمى هامشية
- ٤- داء الرقص لسيدنهايم
- ٥- عقد تحت الجلد

معايير صغيرة : ألم مفاصل و حمى و حصار قلب درجة ١ و ارتفاع عوامل الالتهاب

لوضع تشخيص يجب وجود معاييرين كبيرين أو معايير كبير ومعاييرين صغيرين مع

دليل على إصابة بالعقديات (ارتفاع ASLO) أو الزرع الايجابي

ANTI STREPTOLYSIN O بعيار ٢٤٠ وحتى ٣٢٠ وحدة يعتبر ارتفاع متوسط خاصة في البلاد الموبوءة لكن ارتفاع فوق ٥٠٠ يكون مرضي غالبا

الحمى الرثوية نادرة جدا قبل ٣ سنوات ونادرة بعد ١٥ سنة ، معظم الحالات تحدث بين عمر ٤ و ٩ سنوات

الأعراض تحدث بعد ٢-٣ أسابيع من إصابة البلعوم

تشخيص بديلة :

• **POST-STREPTOCOCCAL ARTHRITIS** التهاب مفاصل تالي للإصابة بالعقديات

• **JIA** التهاب المفاصل الشبابي الأساسي بأنواعه (عديد المفاصل إيجابي أو سلبي ال **RF** وقليل المفاصل و الجهازى (داء ستيل) والمشابه لسليبات المصل وغير المصنف)

• التهاب المفاصل الارتكاسي التالى لإصابة الجهاز البولي أو الهضمي بالإنتان

الآلئ

- يجب التفكير بتشخيص تفريقي للألم المفصلي عند الأطفال
- يفضل العلاج بالصادات عند وجود أي شك للإصابة بالعقديات

لكن

- يجب تأكيد تشخيص الحمى الرثوية قبل وضع الطفل على علاج بالبنسلين المديد لعدة سنوات
- للتفأول : لقاح في طور التحضير للعقديات وسيكون متداولاً خلال ٥ سنوات

التهاب المفاصل الرثياني

الشيوع ١ % تقارب نسبة شيوع الداء السكري

معايير تشخيص التهاب المفاصل الرثياني حسب تصنيف ٢٠١٠

- اشتمال المفاصل

- ٠ إصابة مفصل كبير واحد العلامة
- ١-٢ ١٠ مفاصل كبيرة العلامة
- ١-٣ مفاصل صغيرة العلامة
- ٣-٤ ١٠ مفاصل صغيرة العلامة
- ٥ أكثر من ١٠ مفاصل صغيرة العلامة

إيجابية منخفضة ل **RF** أو **ANTICCP** العلامة ٢

إيجابية مرتفعة ل **RF** أو **ANTICCP** العلامة ٣

مدة الإصابة أكثر من ٦ أسابيع العلامة ١

- ارتفاع **CRP** أو **ESR** العلامة ١

- نضع التشخيص بالحصول على ٦ علامات

• العامل الرثوي RF إيجابي في ٧٠% من مرضى RA

• ANTI CCP إيجابي في ٧٠% من مرضى RA

• ANA إيجابي في ٣٠% من مرضى RA

• علامات الالتهاب: ألم و تورم و حرارة موضعية و احمرار

دلائل على الألم الالتهابي :

الألم الليلي

التيبس الصباحي المطول

الهجمات و الازمان

اصابة المفاصل الصغيرة والكبيرة

التهاب المفاصل غير المصنف

UNDIFFERENTIATED ARTHRITIS

مصطلح يشير الى مجموعة من المرضى لديهم التهاب زليل باكر ولا يناسبون معايير أمراض أخرى

تتضمن هذه الأمراض الانتانات و التهابات الفقار سلبية المصل و أمراض البلورات و التهاب المفاصل الرثياني

لأنه تشخيص يوضع بالاستثناء ، لا معايير خاصة موجودة

معظم الدراسات ترجح أفضلية العلاج بمثبطات المناعة خاصة الميتوتركسات

Early RA

Intermediate RA

Late RA

Recognizing joint inflammation

Relatively normal joint for comparison

Fusiform swelling with decreased skin lines & loss of dimples

الآلئ

• طبيعة الألم الالتهابي مؤشر هام جدا للإصابة الروماتيزمية

• نضع تشخيص التهاب المفاصل الرثياني حتى مع سلبية العامل الرثوي و عدم ارتفاع سرعة التثفل

• البريدلون ليس علاج وحيد أبدا لمرضى الرثياني إنما يمكن استعماله لفترة وجيزة وبجرعة منخفضة كجسر علاجي ريثما الأدوية الأخرى تبدأ بعملها

• نعم الميتوتركسات دواء هام جدا وهو الخط الأول لعلاج العديد من أمراض الروماتيزم

التهابات الفقار سلبية المصل

● مشكلة شائعة تصل نسبتها ١-٢ / ١٠٠٠

● معظم الحالات يتأخر تشخيصها ل ٦ أو ٧ سنوات

● يشمل التهاب الفقار اللاصق حسب معايير نيويورك المعدلة و الداء المحوري اللاشعاعي

الرنين المغناطيسي يظهر التهاب المفصل العجزي الحرقفي قبل الصورة البسيطة

أعراض التهاب الفقار المحوري غير الشعاعي تظهر بنسبة ٢-٣ أضعاف حدوث ال **AS** ولا أفضلية للذكور على الإناث والمرضى قد يتطورون أو لا للداء الشعاعي

معايير نيويورك المعدلة ١٩٨٤ لتشخيص **AS** تتطلب إصابة شعاعية مع أعراض سريرية صريحة

معايير كلاين لألم الظهر الالتهابي :

■ عمر بدء أقل من ٤٠ سنة

■ مدة المرض أكثر من ٣ أشهر

■ بدء مفاجئ

■ تيبس صباحي مطول

■ تحسن الألم مع التمارين

يتطلب التشخيص ٤ معايير من ٥

• معايير برلين لألم الظهر الالتهابي

- تيبس صباحي أكثر من ٣٠ دقيقة

- تحسن الألم بالتمارين لكن ليس بالراحة

- استيقاظ ليلي (في النصف الثاني من الليل فقط)

- ألم إلية متنقل

حساسية ٧٠% ونوعية ٨١% اذا تناسب معياران

• أنماطه :

- التهاب الفقار اللاصق
- التهاب المفاصل الصدافي
- داء رايتز (التهاب المفاصل الارتكاسي)
- المرافق لداء كرون و التهاب الكولون القرصي
- التهاب الفقار اللاصق ذو البدء الشبابي

التهاب الفقار غير المصنف

- يمكن أن يترافق مع أعراض محورية ومحيطية
- يعتبر تشخيص مؤقت حيث تتحول العديد من الحالات لأنواع أخرى من التهابات الفقار
- العلاج يعتمد على سيطرة الأعراض المحورية أم الجهازية

الآلى

• المرحلة الأولى لمقاربة مريض ألم الظهر هي تحديد هل هو ألم التهابي أم ميكانيكي

• عند تشخيص التهاب الفقار اللاصق وعدم التحسن على الـ **NSAIDs** غالباً ما نلجأ للعلاج البيولوجي مباشرة لعدم فائدة مثبتات المناعة التقليدية في علاج الداء المحوري

• ليس بالضرورة الانتظار حتى تآكل المفصل العجزي الحرقفي كاملاً قبل وضع تشخيص التهابات الفقار

منوعات

مضاد استقلاب مشاركة ال **NSAIDS** ، **COX1** أو **COX2** بسبب مضاعفة الآثار الجانبية دون أي زيادة في الفعالية المضادة للالتهاب أو المسكنة للألم وعند مرضى الداء السكري يجب إعطاء ال **NSAIDS** بأقل جرعة ولأقصر فترة ، ويفضل مراقبة الكرياتينين لا يفضل إعطاء ال **COX2** لدى الكبار والمصابين بارتفاع التوتر الشرياني لدى إعطاء ال **NSAIDS** لحالة التهابية يجب اعطاؤها بجرعة كاملة تغطي ٢٤ ساعة والانتظار أحيانا حتى ٣ أسابيع للوصول لضبط الحالة الالتهابية بشكل جيد

• الخثرات الشريانية أو الوريدية أو الأعراض العصبية غير المفسرة لدى الشباب يجب نفي الذئبة الحمامية الجهازية والتهابات الأوعية الجهازية كداء بهجت

• هشاشة العظام لا تشخص بنقص الكالسيوم الشاردي في الدم وإنما بقياس الكثافة العظمية وقبل ذلك يجب تحري فيتامين د لأن نقصه يعطي نتيجة خاطئة لدى قياس الكثافة العظمية

• نقص الكالسيوم وهشاشة العظام لا تسبب ألم مفصلي أو عظمي

بينما نقص فيتامين د قد يسبب ألم ومضض عظمي لكنه لا يسبب أبدا التهاب مفصل

الميتوتركسات: دواء هام جدا لعلاج نسبة كبيرة من مرضى الروماتيزم ويعادل تقريبا أهمية الميتفورمين لمرضى السكري لكن **لا يعطى أبدا دون مراقبة دورية** لوظائف الكبد والكلية والتعداد ودون سماع أصوات الرئة لتحري الآثار الجانبية الخطيرة التي قد يسببها في حال عدم المراقبة بالإضافة لتحري فيروسات الكبد لدى المرضى عاليي الخطورة ولا يعطى بالحمل والإرضاع ويجب إيقافه ٣ أشهر لدى الذكور والانات قبل حصول الإلقاح ويحتاج ل ٣ أشهر ليبدأ مفعوله

• في اختصاص الروماتيزم لا نطلب تحليل لنضع تشخيص

في اختصاص الروماتيزم

١+١ يمكن = ٢ أو ٣ أو ١.٥

المراجع

- **KELLEY & FIRESTEINS TEXTBOOK OF RHEUMATOLOGY 10E –2016**
- **CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT IN RHEUMATOLOGY, 3RD EDITION 2013**
- **MEDSCAP**

د مهند أبوكرشة أخصائي أمراض المفاصل والروماتيزم

شكرا