

الجلسة العملية الرابعة

بعض الأنواع النباتية المتوطنة أو المهددة بالانقراض في سوريا :

(1) نبات الغاز : Rutaceae *Dictamnus albus*

تحت شجيرة تفرز مادة غروية في الصيف لها رائحة عطرية قوية , هذه المادة قابلة للاشتعال , وهو النوع الوحيد في جنس *Dictamnus* , توزعه العالمي (أوروبا، سيبيريا، هيمالايا)، يعتبر من الأنواع النادرة جداً في سورية حيث يتواجد بأعداد محدودة جداً في شمال اللاذقية (عين الحرمة، جنوب كسب، جبل الأقرع). هذا النوع مهدد بشدة بسبب قلة أعداد أفراد، يعتبر تجده شبه معدوم بسبب ضعف إنتاجه للبذور وبالتالي إذا ما تعرض أحد مواقعها للقطع فإن ذلك سيؤدي إلى زواله، يستخدم كنبات طبي وعطري، درجة تهده (1).

(2) سرخس أذنان الخيل : Equisetaceae *Equisetum maximum*

نبات معمر يتواجد في المناطق ذات الرطوبة الأرضية العالية وعلى ضفاف المجاري المائية (حزيرين - القساطل - دورين) في سوريا أما عالمياً فيوجد في أوروبا وآسيا الداخلية وشمال أفريقيا , تتراجع مناطق انتشار هذا النوع بشكل مستمر لذلك هو مهدد بشدة ودرجة تهده (1).

(3) السرخس طويل الأوراق : *Pteris Longifolia* Pteridaceae

يتميز هذا النوع بأوراقه الطويلة التي يصل طولها حتى 100 سم , يعيش على أطراف المياه وعلى الصخور التي تتضح بالماء , يصادف في الحالة الطبيعية في المناطق المدارية وبين المدارية , أما في سوريا فيتواجد في موقعين بعدد أفراد قليل جداً (مجرى مائي عذب في منطقة البدرسية على ارتفاع 120 م + مجرى نبع حزينين على ارتفاع 330 م), تتراجع مواقع انتشار هذه النوع باستمرار لذلك يعتبر مهدد بشدة ودرجة تهده (1) .

(4) سرخس نبات الزينة: *Dryopteris Aculeata* Aspleniaceae

أحد أنواع السرخسيات النادرة جداً التي تمتاز بأوراق سرخسية ريشية يتراوح طولها من (20-130) سم , صودف في سوريا ما يزيد على عدة عشرات من الأفراد في غابة البتيسة (غرب حمص) على أطراف مجرى مائي في مكان مظلل و رطوبته عالية , درجة تهده (2) .

(5) *Phyllitis Scolopendrium* Aspleniaceae

نبات سرخسي يمتلك أوراق سرخسية داكنة اللون خضراء سمكية غير مجزئة ذات حافة متموجة طوله من (15-30) سم أو أكثر , يصادف في الآبار والمغارات وتحت الغابات الرطبة على أطراف الينابيع , صودف في سوريا في ثلاثة مواقع (حزيرين - وادي شيخان - ومجرى مائي شمال شيخان) , درجة تهده (1).

(6) النبق اللامع : *Rhamnaceae* *Frangula Alnus*

شجيرة يبلغ طولها (3-6) م تنتشر في أوروبا ووسط وغربي آسيا وتركيا وإيران والقوقاز وشمال إفريقيا (المغرب) ، حيث يعتبر في أوروبا من النباتات الطبية المرموقة جداً. في سورية ينتشر حول المناطق الرطبة في الفرنلق، نوع مهدد بشدة ودرجة تهده (1).

(7) السيلين أخضر الأزهار : *Caryophyllaceae* *Silena Amana*

نبات عشبي معمر متوطن في شمال اللاذقية والأمانوس حيث لوحظ في قمة النبي متى وصلنفه وظهرة العزر ، درجة تهدد (3) .

(8) العنّاب : *Rhamnaceae* *Zizyphus Lotus*

شجيرة شوكية مثمرة، يصل طولها لـ 10 م ، متحملة للجفاف، حساسة قليلاً للبرد، تنتشر عالمياً في حوض المتوسط والسعودية ويتواجد في سورية في مناطق عدة على ضفاف نهر دجلة والسلمية وبانياس ولكن بأعداد قليلة، تُجمع ثماره كغذاء ، ويستخدم كمصدر للأخشاب مما أدى لتراجع أعداده ،درجة تهده (4).

(9) الدردار السوري : *Fraxinus syriaca* Oleaceae

نوع شجري ذو ارتباط بالمياه. لاسيما المستنقعات، ينتشر برياً في افغانستان وايران والعراق وسورية ، حيث كان يتواجد في سورية في منطقة الغاب لكن لم يبق من تجمعاته سوى بعض البقع المتباعدة بسبب تجفيف مستنقع الغاب، كما يوجد على شواطئ النهر الأسود شمال غرب عفرين. تتراجع أعداد هذا النوع بسبب ضعف التجدد لتهدم البيئة والقطع الجائر لاستخدام خشبه. درجة التهدد (2).