

جامعة حماة

كلية الهندسة الزراعية – سلمية

السنة الرابعة – الفصل الثاني

تتوفر جميع المحاضرات والدورات وسلاسل التصحيح في مكتبة الغد
دوار شارع حماة جانب أزياء ماتادور

الطاقة المتجددة

الجلسة (3)

عملي

2023

د . داوود ملوك

مركز تصوير كلية الزراعة والعمارة

مكتبة الغد

Page number

8

الغاز الحيوي biogas

١- تقنية إنتاج الغاز الحيوي – الهضم اللاهوائي


تعتمد تقانة الغاز الحيوي على تفكك المخلفات والمواد العضوية وتحللها، وذلك في ظروف لاهوائية بواسطة الكائنات الحية الدقيقة وبشروط ملائمة للعمليات الحيوية التي تقوم بها هذه الكائنات ضمن الهاضم، مما يؤدي إلى انطلاق غاز قابل للاشتعال يعرف بالغاز الحيوي، والذي يشكل غاز الميثان الجزء الأكبر من تركيبة. إضافة إلى ذلك ينتج عن عملية التخمير مادة غنية تستخدم كسماد عضوي نظيف وعالي الجودة وخالي من البذور الضارة والكائنات الممرضة وليس له رائحة جاذبة للحشرات.

١-٢- مراحل عملية التخمير اللاهوائي

التخمير اللاهوائي هو عملية تحطيم وتفكيك المواد العضوية من أجل إنتاج الغاز الحيوي، وتتم هذه العملية ضمن وحدات معزولة تماماً عن الهواء تسمى المخمرات، حيث تقوم فيها الكائنات الحية الدقيقة بتحويل المواد العضوية إلى غاز حيوي في ظل ظروف لا هوائية. يتضمن التخمير اللاهوائي أربع مراحل رئيسية هي: الحلمة (hydrolysis)، التحميض (acidogenesis)، تشكل حمض الخل (acetogenesis) ومرحلة تشكل الميثان (methanogenesis).

١-٢-١- مرحلة الحلمة (hydrolysis):

الحلمة أو التحلل المائي (Hydrolysis) هو المرحلة الأولى من التخمير اللاهوائي. خلال التحلل المائي، تتحلل ركائز معقدة مثل المواد العضوية التي تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والدهون إلى جزيئات أبسط قابلة للذوبان. تتحلل السكريات إلى سكريات بسيطة، والبروتينات إلى الأحماض الأمينية، والدهون إلى الجلسرين والأحماض الدهنية طويلة السلسلة، حيث تقوم بكتريا (Hydrolytic bacteria) بإطلاق إنزيمات خارجية (Exoenzymes) تقوم بتحويل الجزيئات المعقدة إلى جزيئات أبسط وفق المخطط التالي: (ملاحظة: أسماء الإنزيمات في المخطط للاطلاع)



تؤمن الدهون إنتاج عالي من الغاز الحيوي ولكنها تحتاج إلى زمن بقاء أطول بسبب قدرتها الضعيفة على التحول البيولوجي (bioavailability) بعكس الكربوهيدرات والبروتينات التي تظهر معدلات تحول أسرع ولكن غاز حيوي أقل.

١-٢-٢- مرحلة التخمير (Acidogenesis):

التكوّن الحامضي أو مرحلة التخمض Acidogenesis، والذي يُطلق عليها أيضًا التخمر (fermentation)، ويتم خلال هذه المرحلة تحويل منتجات التحلل المائي أو منتجات مرحلة الحلمهة - وذلك بواسطة بكتيريا التخمير (acidogenic bacteria) - إلى الأحماض الدهنية المتطايرة (VFAs) والكحولات والهيدروجين (H_2) و غاز ثنائي أوكسيد الكربون (CO_2).
يبين الجدول (١) أمثلة على منتجات مختلفة من تخمر سكر الجلوكوز خلال مرحلة الحلمهة

الجدول (١) أمثلة على منتجات مختلفة من تخمر سكر الجلوكوز خلال مرحلة الحلمهة (الإطلاع)

النواتج	التفاعل
Acetate	$C_6H_{12}O_6 + 2H_2O \rightarrow 2CH_3COOH + 2CO_2 + 4H_2$
Propionate + Acetate	$3C_6H_{12}O_6 \rightarrow 4CH_3CH_2COOH + 2CH_3COOH + 2CO_2 + 2H_2O$
Butyrate	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow CH_3CH_2CH_2COOH + 2CO_2 + 2H_2$
Lactate	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CHOHCOOH$
Ethanol	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CH_2OH + 2CO_2$

١-٢-٣- مرحلة تشكل حمض الخل (acetogenesis):

في مرحلة تشكل حمض الخل acetogenesis تتحول الحوض العضوية والمركبات الأخرى - ويطلق عليها عادة منتجات وسيطة متخمرة fermentative intermediates - إلى حمض الخل (acetic acid) وثنائي أوكسيد الكربون والهيدروجين.


يبين الجدول (٢) تحول بعض الأحماض الدهنية المتطايرة الأساسية إلى حمض الخل CH_3COOH .

الجدول (٢) تحول بعض الأحماض الدهنية المتطايرة الأساسية إلى حمض الخل CH_3COOH (للاطلاع)

الركيزة	التفاعل
Propionic acid	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 3\text{H}_2 + \text{CO}_2$
i-butyric acid	$\text{CH}_3(\text{CHCH}_3)\text{COOH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{H}_2$
Butyric acid	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{H}_2$
i-valeric acid	$\text{CH}_3(\text{CHCH}_3)\text{CH}_2\text{COOH} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow 3\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2$
Valeric acid	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow 3\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2$


١-٣-٤- مرحلة تشكل غاز الميثان (Methanogenesis):

تتمثل الخطوة الأخيرة لعملية الهضم اللاهوائي في تكوين الميثان methanogenesis، وتعمل ضمن هذه المرحلة مجموعتان رئيسيتان من أجناس بكتريا الميثان (methanogens)، حيث يتم إنتاج غاز الميثان CH_4 ، إلى جانب غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 . هناك مساران رئيسيان لمرحلة تكوين الميثان. في المسار الأول (acetoclastic methanogenesis) تقوم بكتريا (acetoclastic methanogens) والتي تهيمن على ٩٠% من تعداد بكتريا الميثان في هذه المرحلة - والتي تسمى أيضاً في بعض المراجع (acetotrophic methanogens) - باستقلاب حمض الخل (acetic acid) إلى غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون. وفي المسار الثاني يتم إنتاج غاز الميثان بالإضافة إلى الماء من غاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين (إرجاع ثاني أكسيد الكربون بالهيدروجين) وذلك عن طريق بكتريا (hydrogen-consuming archaea) أو (hydrogentrophic methanogens)، والتي تسمى أيضاً بالبكتريا المستخدمة أو المستهلكة للهيدروجين (Hydrogen-utilizing methanogenic bacteria). يتم بشكل عام إنتاج ٧٠% من غاز الميثان خلال العمليات البيولوجية في المسار الأول، و ٣٠% في المسار الثاني.



تعتبر مرحلة تشكل الميثان المرحلة الحرجة بالمقارنة مع المراحل السابقة، حيث أن بكتريا الميثان شديدة الحساسية لطرف التشغيل والبيئة الحاضنة لعملية الهضم اللاهوائي

وفيما يلي الشكل (١) الذي يوضح الطريق الذي تسلكه المواد العضوية والنسب المئوية لتفكك هذه المواد ضمن كل مرحلة من المراحل التي وردت في الفقرات السابقة أثناء رحله التحطم البيولوجي التي تنتهي بتشكيل غاز الميثان (للاطلاع)



الشكل (١) مخطط يبين مراحل التخمر اللاهوائي التفصيلية (للاطلاع)

١ - ٣ - صفات الغاز الحيوي

الغاز الحيوي (biogas) هو غاز قابل للاشتعال يتشكل نتيجة للتفكك البيولوجي للمادة العضوية وذلك بواسطة البكتريا اللاهوائية، وتتم العملية بالمجمل في ظروف غياب الأوكسجين، وبمعنى آخر إن الغاز الحيوي المتشكل هو أحد نواتج هدم المادة العضوية أثناء عملية تنفس واستقلاب الخلايا البكتيرية. يتم إنتاج الغاز الحيوي باستخدام تقنية التخمر اللاهوائي ضمن مواضع مخصصة، لذلك ويتكون بشكل رئيسي من الميثان وغاز ثاني أوكسيد الكربون.

يشتعل الغاز الحيوي دون أن يتصاعد منه دخان مكونا لهب أزرق شديد الحرارة، والطاقة الناتجة من ١ م^٣ من الغاز الحيوي (نسبة الميثان ٦٥%) تكافئ ٠.٧ لتر بنزين و ٠.٦ م^٣ غاز طبيعي، والطاقة الحرارية الناتجة عن حرق ٠.٨ كغ خشب (١٢% رطوبة). وبالنسبة للاستخدامات المنزلية فإن ١ م^٣ من الغاز الحيوي تكفي لطهي ثلاث وجبات لعائلة مؤلفة من ٥-٦ أشخاص. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بسبب الصفات الكيميائية والفيزيائية للغاز الحيوي، فإن مواعد غاز البوتان التجارية ليست ملائمة للغاز الحيوي، حيث يلزم ٦ لتر من الهواء لحرق لتر واحد من الغاز الحيوي، لذلك نحتاج إلى مواعد ذات فوهات غاز أكبر.

الغاز الحيوي أخف من الهواء وتبلغ حرارة الاشتعال له ٧٠٠ C° ومن الصعب إسالته، وهو غاز عديم اللون يتطاير بالهواء للأعلى كون وزنه أخف من الهواء (نصف كثافة الهواء). ويعتمد تركيب الغاز الحيوي على تركيب المواد العضوية المتفككة، فإذا كانت المادة العضوية تتكون بشكل رئيسي من الكربوهيدرات تكون نسبة الميثان في الغاز الحيوي أقل مقارنة بالمادة العضوية التي تشكل الدهون النسبة الأكبر من تركيبها. ويتكون الغاز الحيوي بشكل رئيسي من غاز الميثان (٥٥ - ٧٠%) و غاز ثاني أوكسيد الكربون (٣٠ - ٤٥%) ونسبة قليلة (١-٢%) من غازات أخرى مثل / H₂S - H₂ - NH₃ - CO - N₂ - O₂/. ويعتبر غاز الميثان - المكون الرئيسي للغاز الحيوي - هو الغاز الحامل للطاقة.

نهاية الجلسة

