

تحت مملكة الحيوانات التوالي

Metazoa

د. ماجد موسى

شعبة الإسفنجيات Spongia

شعبة الإسفنجيات Spongia

ما هي الصفات العامة للإسفنجيات:

١- تعيش معظم أنواع الاسفنجيات في المياه البحرية والقليل منها في المياه العذبة.

٢- يتصف الجسم بالشكل الكيسي أو الإهليلجي، وتتراوح أبعادها بين

١ - ١.٥ سم.


٣- يتألف جدار الجسم من ٣ طبقات، تكون الطبقة الداخلية منها مؤلفة من خلايا مطوقة ذات سياط، ويتكون الهيكل من مجموعة من الأشواك.

٤- على جدار الجسم توجد فتحات تسمح بدخول الماء المحمل بالمواد الغذائية (تدعى بالفوهات الشهيقية)، ويوجد في قمة الحيوان فوهة تسمح بخروج الفضلات (تدعى بالفوهة الزفيرية).

٥- تتميز الإسفنجيات بأنها أبسط الحيوانات التوالي، ولا تحتوي على أجهزة هضم أو تنفس

أو إفراغ

٦- تتكاثر الإسفنجيات جنسياً ولا جنسياً




بنية الإسفنجيات

• يوجد منها عدة نماذج هي:

١- نموذج الأسكون Ascon

٢- نموذج السيكون Sycon

٣- نموذج الليكون Leucon




بنية الإسفنجيات

- يوجد منها عدة نماذج هي:

١- نموذج الأسكون

٢- نموذج السيكون Sycon

٣- نموذج الليكون





نموذج السيكون

بنية الإسفنجيات


• يوجد منها عدة نماذج هي:

- ١- نموذج الاسكون
- ٢- نموذج السيك
- ٣- نموذج الليكون Leucon



نموذج الليكون

تختلف هذه النماذج عن بعضها بدرجة تعقيد بنيتها، فعند الليكون تكون البنية أكثر تعقيداً منها عن بقية النماذج، يليه نموذج السيكون ثم الأسكون.



نموذج الأسكون وهو أبسط نماذج الإسفنجيات.


- يأخذ شكل قارورة،
- يتثبت على الصخور بواسطة قدم،
- يدخل الماء بواسطة الفتحات الشهيقية ويصب مباشرة في الجوف المركزي، ويخرج عن طريق الفوهة الزفيرية.

أما **جدار الجسم** فيتكون من ٣ طبقات:

١- **الطبقة الخارجية**: وتتألف من خلايا
ظهارية مسطحة **تقوم بوظيفة حماية**
الإسفننج.

٢- **الطبقة الداخلية**: تحيط بجوف الحيوان
وتتألف من خلايا متميزة **لا توجد إلا في**
الإسفنجيات تدعى بالخلايا المطوقة
(القمعية) والتي تشتمل على نواة وفجوات
هاضمة وفجوات نابضة.


٣- **الطبقة المتوسطة**: تتألف من مادة هلامية
تتوزع فيها **خلايا أميبية** وخلايا مولدة
للاشواك.



أما **الهيكل**: يتألف من هيكل كلسي
وهيكل عضوي بروتيني،

الهيكل الكلسي: فيتمثل بشويكات دقيقة
أبرية الشكل أو ثلاثية أو رباعية
الأشعة.

أما الهيكل العضوي: فيتألف من مادة
الإسفنجين ويأخذ شكل ألياف متشابكة
ومتفرعة



• الوظائف الحيوية ؟؟؟:

١- الحساسية:

تستجيب للمؤثرات الخارجية بعض خلايا الإسفنجيات مثل الخلايا المحيطة بالفوهات والخلايا السمية (الثقبية)،

فهي تنقبض وتغلق الفوهات وحالما يزول المؤثر الخارجي تعود فتنبسط.

يعتقد بوجود جهاز عصبي بدائي.



٢- التغذية:

تدخل المواد الغذائية (جراثيم، أشنيات، حيوانات أوالي) إلى الجوف المركزي عبر الفوهات الشهيقية فتقوم **الخلايا المطوقة** باقتناص هذه المواد الغذائية بواسطة الأرجل الكاذبة التي تتشكل تحت طوق الخلية المطوقة،

وفور وصول المادة الغذائية إلى هيولى الخلية المطوقة تتشكل حولها فجوة هاضمة حيث يتم هضم الغذاء،

تنقل الخلايا الأميبية الغذاء المهضوم إلى خلايا الجسم الأخرى بطريقة الانتشار،

أما فضلات الهضم فتطرح إلى الجوف المركزي ومنه للوسط الخارجي عبر الفوهة الزفيرية.


إذاً: الهضم عند الإسفنجيات يتم داخل الخلايا ولا يمكن اعتبار الجوف المركزي في الإسفنجيات جوفاً معوياً، إذ يشكل ممراً للماء والمواد الغذائية دون أن تحدث فيه عمليات هضم.

٣- التنفس والإطراح:

تحصل الإسفنجيات على الأكسجين من الماء الذي يدخل إلى الجوف المركزي عبر الفوهات الشهيقية، وذلك عن طريق الانتشار،

ويطرح CO₂ من الخلايا إلى الجوف المركزي حيث يخرج تيار الماء عبر الفوهة الزفيرية

وتقوم **الخلايا الأميبية** بتخليص الفضلات البولية وتطرحها في الجوف المركزي.



٣- التكاثر:

تتكاثر الإسفنجيات بالطريقتين الجنسية واللاجنسية.

١- **التكاثر اللاجنسي:** يحصل بالتبرعم الخارجي أو بالتبرعم الداخلي،

أ- **التبرعم الخارجي:** يتم بتشكيل بروز على سطح الإسفنج الأم وذلك باندفاع جميع طبقات الجسم وجوفه، ينفث البروز في قمته فتتشكل الفوهة الزفيرية، يفصل البرعم المتشكل عن جسم الأم ليتابع حياته المستقلة. في معظم أنواع الإسفنجيات تبقى البراعم متصلة مع جسم الإسفنج الأم فتتشكل مستعمرة إسفنجية.

ب- **التبرعم الداخلي:** يحصل في إسفنجيات الماء العذب، وذلك بتشكيل تجمعات خلوية داخل جسم الإسفنج ، وهي مجموعة خلايا أميبية تحاط بجدار قاسي، وعندما تموت الأم في فصل الشتاء تتحرر الدريرات وتبقى حتى فصل الربيع حيث تتطور وتنمو وتصبح إسفنجاً جديداً.

١- التكاثر الجنسي:

- الإسفنجيات حيوانات خنثوية، والإلقاح عندها متبادل، تتشكل الأعراس من الخلايا الأميبية، تصل النطاف إلى الجوف المركزي ومنه إلى الوسط الخارجي عن طريق الفوهة الزفيرية ثم تنتقل إلى الجوف المركزي لإسفنج آخر عبر فوهات الشهيقية، ثم تصل النطاف من خلال الخلايا المطوقة إلى البيضة حيث يتم الإلقاح،
- تنقسم البيضة الملقحة عدة انقسامات وتشكل كتلة خلوية تدعى بالتويطة Morula ،
- تتطور التويطة ويحصل فيها جوف محاط بطبقة خلوية مشكلاً بذلك الأريمة Blastula يحتوي النصف العلوي منها على خلايا اسطوانية ذات سياط، وفي النصف السفلي خلايا مغذية كبيرة تدعى هذه اليرقة بـ Amphiblastula،
- تبقى هذه اليرقة في جسم الأم ويحصل عندها انخماص خلايا النصف العلوي متشكلاً بذلك مرحلة المعيدة Gastrula التي تخرج من جسم الإسفنج وتثبت على الأجسام وتتطور إلى إسفنج جديد.



تصنيف الإسفنجيات


- تقسم شعبة الإسفنجيات وفق طبيعة هياكلها إلى الصفوف التالية:

١- صف الإسفنجيات الكلسية *Calcarea*: تعيش أنواع هذا الصف في المياه البحرية ويتألف الهيكل عندها من أشواك مكونة من كربونات الكالسيوم.



Calcarea

٢- صف الإسفنجيات السيليكية *Silicispongia*: الأشواك عند أنواع هذا الصف هي أشواك سيليسية، وتعيش هذه الأنواع في المياه البحرية.



Silica structure

٣- صف الإسفنجيات الغروية *Cornacuspongia*: يلاحظ تشكل كميات كبيرة من الإسفنجيات في الطبقة الهلامية عند هذه الإسفنجيات التي تخلو من الأشواك أو أنها تشتمل على كميات قليلة من الأشواك الكلسية، تعيش بعض أنواع هذه الإسفنجيات في البحار ويعيش بعضها الآخر في المياه العذبة.



Cornacuspongia

أهمية الإسفنجيات

- تستخدم بعضها للحصول على مساحيق تستخدم في الغسيل وفي ذلك الجسم المصاب بالكدمات.
- تقوم الإسفنجيات بتنقية كميات كبيرة من المياه عن طريق مسامها.
- يستفاد من بعض أنواع الإسفنجيات في صناعة الإسفنج الذي يستخدم في غسيل الجسم.
- تؤلف مستعمرات الإسفنجيات مساكن لعدد من الحيوانات كالديدان الحلقية والقشريات.

صف الطيور Aves

د. ماجد موسى


صف الطيور Aves

الصفات العامة:

- ١- من ذوات الحرارة المتجانسة.
- ٢- يتألف الجسم من رأس ورقبة وأطراف وذيل قصير، يغطي الجسم أرياش.
- ٣- تتميز عن بقية الفقاريات بنشاط حركي عال وبارتفاع العمليات الاستقلابية.
- ٤- ينعدم وجود المثانة البولية،
- ٥- **عندها مبيض واحد والأمعاء قصيرة** وذلك بغية تخفيف الوزن مما يساعد على الطيران.
- ٦- تمتلك معدة مكونة من حويصلة وبطين وقانصة.
- ٧- يتكون القلب من أربعة أجواف منفصلة وهذا يعني أن الدم الشرياني منفصل عن الدم الوريدي.
- ٨- يلحق بالجهاز التنفسي أكياس هوائية.
- ٩- الكلية من نمط الكلى التالية (الحوضية).
- ١٠- منفصلة الجنس والإلقاح عندها داخلي.

بنية جدار الجسم

- يتألف الجلد عند الطيور من بشرة تتقرن طبقتها الخارجية، ومن أدمة تتألف من نسيج ضام غني بالمواد الدهنية الاحتياطية.
- تندر في جلد الطيور الغدد الجلدية ما عدا بعض الأنواع التي تشتمل على غدد دهنية كالغدد الذيلية.
- أما التشكلات الجلدية عند الطيور فتتمثل بالحرشف التي تغطي المنقار والأرجل وكذلك الأرياش التي تغطي الجسم وتحميه من تأثير العوامل الخارجية وتساعد على الطيران كما تقوم بوظيفة العزل الحراري للجسم.



البنية الداخلية والوظائف الحيوية

الجهاز العصبي وأعضاء الحس:


شكل توضيحي لبنية الدماغ عند الإوز

- يتصف دماغ الطيور بتطوره مقارنة مع نظيره في الأسماك والبرمائيات والزواحف.
- يتألف الدماغ من: **نصفي كرتين مخيتين** مجردتين من التلافيف والأخاديد التي نجدها في دماغ الثدييات.
- **مخيخ** كبير الحجم يقوم بوظيفة تنظيم حركة الحيوان ويضمن توازن الطيور خلال طيرانها.
- يقع على جانبي المخيخ **فصان بصريان** متطوران وهما على علاقة بتطور البصر عند الطيور. أما الفصوص البصرية فهي ضعيفة التطور.
- يصدر عن الدماغ ١٢ شغفاً من الأعصاب الدماغية. أما **النخاع الشوكي** فيمتد من النهاية الأمامية إلى الفقرة الأخيرة للعمود الفقري.
- يصدر عن النخاع الشوكي مجموعة من **الأعصاب الشوكية** المحركة والحسية. وتضم الجملة العصبية جهازاً عصبياً ودياً.
- أما أعضاء الحس فتتمثل بالمستقبلات البصرية والسمعية والذوقية وحس الألم.

- تتصف الطيور بتطور الأذن بالمقارنة مع الزواحف، وتشبه الأذن الداخلية في الطيور نظيرتها في الثدييات لكنها تختلف عنها بأن الحلزون قصير وغير ملتف.

شكل توضيحي للأذن الداخلية في الطيور

- أما الأذن الوسطى فتحتوي على عظمة واحدة هي الركابي، وتتمثل الاذن الخارجية بمجرى سمعي قصير ينتهي بغشاء الطبل.



- أما العين عند الطيور فتتميز بحدة البصر وبمساحة رؤيا واسعة. تزود العين بثلاثة جفون تحميها من المؤثرات الخارجية. تتميز قرنية العين في الطيور عن باقي المجموعات الفقارية باحتوائها على **ألياف عضلية مخططة، وهذا ما يفسر توسع الحدقة أو تضيقها بشكل سريع.**

- أما الجسم البلوري (العدسة) فيأخذ الشكل الدائري ويتغير تحدبه خلال عملية المطابقة عن طريق العضلات الهدبية التي تحيط بها. تتميز العين في الطيور عن غيرها من الفقاريات باحتوائها على شفع من النقر المركزية

• الجهاز العضلي:

تشتمل الطيور على عضلات هيكلية متطورة كعضلات الفخذ والرقبة والعضلات الصدرية

• جهاز الهضم:

الطيور مجردة من الأسنان وتبتلع الغذاء الجاف دون مضغ لذا تكون القناة الهضمية مزودة بمعدة ذات بنية خاصة متكيفة لمعالجة هذه المواد الغذائية.



يبدأ جهاز الهضم **بالتجويف الفموي** تصب فيه مفرزات الغدد اللعابية التي تقوم بوظيفة تبلييل المواد الغذائية ، تكون **الغدد اللعابية في الطيور المائية** متراجعة إذ لا حاجة لها. يحتوي التجويف الفموي على لسان ضيق.

يلي التجويف الفموي **بلعوم قصير** يتصل مع **مري** طويل يتوسع في نهايته مشكلاً **الحوصلة** التي تكون متطورة عند الطيور أكلات الأعشاب وبعض الطيور أكلات الأسماك ويتم فيها ترطيب المواد الغذائية وهضمها جزئياً وتمتلك الحوصلة القدرة على إفراز مواد غذائية تنقلها هذه الطيور إلى صغارها.

فقد تبين أن مخاطية الحوصلة عند إناث وذكور الحمام تفرز مادة تسمى **بالحليب الحوصلي** تستخدمها في تغذية فراخها، ويحصل إفراز الحليب الحوصلي تحت تأثير هرمون البرولاكتين الذي تفرزه النخامى الأمامية، تفرز حوصلة بعض أنواع الطيور سائلاً يحتوي على الكريات الحمراء.

أما **المعدة** فتتكون من جزئين هما: البطين المفرز (المعدة الغدية) Proventriculus والقانصة (المعدة العضلية) Gizzard التي تمتلك جداراً عضلياً ثخيناً، وتكون في الطيور اللاحمة أصغر حجماً من البطين المفرز.

يلي القانصة **الأمعاء الدقيقة** التي تبتدئ بالإثني عشر التي تشكل عروة ضيقة تقع المعثكلة في انثنائها،

وتصب في الإثني عشر عصارة المعثكلة (البنكرياس) التي تحتوي على إنزيمات الأميلاز والليباز والبروتيناز، كما تصب فيها مادة الصفراء الأتية من الحويصل الصفراوي الموجود في الكبد.

يلي الأمعاء الدقيقة **الأمعاء الغليظة** التي تنتهي بالمذرق .

يوجد في الحد الفاصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة شفع من الأمعاء الأعورية.


القانصة تقوم بوظيفة تفكيك المواد الغذائية كما يتم فيها هضم كيميائي بمستوى بسيط، وذلك جراء وصول كمية قليلة من الإنزيمات من المعدة الغدية إليها.

يستمر الهضم الكيميائي في الأمعاء الدقيقة ثم يحصل امتصاص المواد المهضومة في هذه الأمعاء.

وتحتوي الأمعاء الأعورية بعض أنواع الجراثيم التي تفكك السيلليلوز كما أنها تنتج بعض الفيتامينات.

The Respiratory System

بنية جهاز التنفس عند الطيور



• جهاز التنفس:

✓ يتألف من المجاري التنفسية والرئتين و الأكياس الهوائية، تبدأ المجاري التنفسية بفتحة الحنجرة، يليها الرغامى التي تتفرع إلى قصبتي هوائيتين يدخل كل منها إلى رئة حيث تتفرع القصبة الهوائية إلى قصيبات هوائية تتخلل النسيج الرئوي وتستمر إلى الأكياس الهوائية.

✓ تمتلك الطيور ٩ أكياس هوائية،

✓ يوجد عند معظم الطيور (المغردة) عضو تصويت يقع في منطقة تفرع الرغامى.

✓ تمتاز الرئتين ببنية إسفنجية تشتمل على أجواف دقيقة مقسمة بحواجز وغنية بالشعيرات الدموية، وليس للرئتين حجم كبير بالمقارنة مع حجم الطير ولكن سطحها واسع.


✓ تحصل الحركات التنفسية بتوسع القفص الصدري وهذا ما يؤدي إلى توسع الأكياس الهوائية واندفاع الهواء إلى الرئتين ومنها إلى هذه الأكياس وأما الزفير فيحصل بتضيق القفص الصدري فتنضغط الأكياس الهوائية ويندفع الهواء الموجود منها إلى الرئتين ومنها إلى الخارج.

✓ تجدر الإشارة إلى أن التبادل الغازي يتم في الرئتين فقط بينما تملأ الأكياس الهوائية من الشعيرات الدموية لذا يقتصر دورها على تحقيق عمليتي الشهيق والزفير، إذ يبقى حجم الرئة ثابتاً خلال حدوث الحركات التنفسية، وتقوم الأكياس الهوائية بوظيفة تزويد الرئتين بالهواء خلال الزفير فالتبادل الغازي عند الطيور إذاً يتم خلال الشهيق والزفير.

• الجهاز البولي (الإفراغي):

✓ يتألف من كليتين حوضيتين لهما شكل مسطح ولون أحمر عاتم يقعان على جانبي العمود الفقري في القسم الخلفي من تجويف الجسم وتتألف كل كلية من ٣ فصوص ويحصل في عروة هائلة أو عروة هينل من الأنبوب البولي عودة امتصاص الماء.

✓ يخرج من كل كلية حالب يصب في المذرق حيث لا تمتلك الطيور مثانة بولية.




بنية الجهاز البولي في الطيور

• الجهاز التناسلي:


١- الجهاز التناسلي الذكري:

يتألف من خصيتين تتوضعان بجوار
القفص الأمامي للكليتين ،

يخرج من كل خصية قناة ناقلة للنطاف
الذي ينفتح في المذرق .



بنية الجهاز التناسلي الذكري



٢- الجهاز التناسلي الأنثوي:

تشتمل إناث الطيور على المبيض الأيسر فقط،


أما المبيض الأيمن فهو ضامر

ويشتمل المبيض في الطير الناضج على البيوض في مراحل مختلفة من تطورها،

أما القناة الناقلة للبيوض فهي تتوسع الناحية القريبة من المبيض مشكلة القمع وتنفث نهايتها الخلفية في المذرق.

بنية الجهاز التناسلي الأنثوي

شكل توضيحي إجمالي لمكونات الجسم عند الطيور



• الإلقاح والتطور عند الطيور ؟؟؟:

لا يوجد عند معظم الطيور عضو اقتران ذكري (قضيبي ذكري) ، أما الإلقاح فهو داخلي عند جميع الطيور حيث يحصل إلقاح البيضة في المنطقة الأمامية من القناة الناقلة للبيوض حيث تكون البيضة مكونة من الصفار (المح) فقط،

تنتقل الخلية البيضية الملقحة في القناة الناقلة للبيوض، ويتشكل حولها مواد زلالية (البياض) تفرزها غدد متوضعة في جدار القناة،

وفي القسم السفلي من القناة الناقلة للبيوض يحاط الزلال بقشيرة ورقية (رقيقة) ثم قشرة كلسية ، يبدأ التشكل الجنيني في بيضة الطيور التي ما تزال في القناة الناقلة للبيوض ويستمر بعد خروج البيضة إلى الوسط الخارجي شريطة تعرض هذه البيوض إلى وسط دافئ.

تصنيف الطيور

يضم صف الطيور ٣ فوق رتب، هي:

- ١- فوق رتبة الرواكض Ratite.
- ٢- فوق رتبة البطاريق Sphenisciformes.
- ٣- فوق رتبة الجؤجئيات Neognathae.

تصنيف الطيور

أ- فوق رتبة الرواكض Ratite:

- تتميز بعدم وجود القصرة والأسنان.
- تشترك أنواع هذه المجموعة ببنية الحوض وأساليب التعشيش وبوجود عضو تناسلي ذكري (القضيبي)، وباعتناء الذكر بالبيض والفراخ أكثر من الإناث.
- تشتمل الرواكض على ٥ رتب نذكر منها:

* رتبة نعاميات الشكل Struthioniformes:

- ❖ أكبر الطيور حجماً،
- ❖ غير قادرة على الطيران،
- ❖ وهي متأقلمة للمشي السريع. الأرجل عندها طويلة، ويشتمل كل منها على إصبعين،
- ❖ الجنسان منفصلان ولهما شكلية ثنائية جنسية تتجلى بلون الريش الذي يكون ملوناً عند الذكر بالأبيض والأسود وعند الأنثى يكون قاتماً.
- ❖ تخلو نعاميات الشكل من عظم الترقوة.
- ❖ من أنواع نعاميات الشكل نذكر النعامة الجمل Stuthio camelus



النعامة الجمل
Stuthio camelus

* رتبة لاجناحيات الشكل Apterygiformes:

- ❖ تتشابه أفرادها من حيث الحجم مع الدجاج،
- ❖ غير قادرة على الطيران إذ تراجع أجنحتها تراجعاً شديداً،
- ❖ تكون أرياش التغطية لديها شبيهة بالفراء،
- ❖ يختفي عند هذه الطيور عظام الترقوة والقصرة والكتف ،
- ❖ تتميز الذكور بأنها أصغر حجماً بمقدار ٤٠ % من الإناث.
- ❖ مثال: طائر الكيوي.



طائر الكيوي
apteryx owenii

٢- فوق رتبة البطاريق Sphenisciformes:

تتميز بعدم قدرتها على الطيران،

تمتلك القدرة على السباحة في مياه البحار إذ تحولت أجنحتها إلى زعانف،
تشتمل هذه الطيور على قصرة وتمتاز بتحول أرياشها إلى فرو يمنع تبلييل الجسم
بالماء،

يتوضع تحت الجلد طبقة شحمية تشكل مع الفراء طبقة عازلة تقلل فقدان الحرارة
من الجسم، إذ تعيش هذه الطيور في الأماكن الباردة،
تتوضع الأرجل في الناحية الخلفية من الطير،

من أنواع البطاريق نذكر البطريق *Spheniscus humboldti*



الإوزة Cygnus olor



٣- فوق رتبة الجؤجئيات Neognathae:

تتشابه مع الرواكض بأنها مجردة من الأسنان لكنها تختلف عنها بشكل الحوض والمنطقة العلوية من القصبة الهوائية، وبعدم وجود القضيب.

البط Netta rufina



تشتمل الجؤجئيات على ٢٣ رتبة نذكر منها:

١- رتبة الأوزيات Aneriformes: تتصف هذه الطيور

بحجوم متوسطة أو كبيرة وبرقبة طويلة وبقصر المنقار والأرجل وبمعي أعور طويل، من أنواع الأوزيات نذكر الإوزة Cygnus olor والبط Netta rufina

طاووس من جنس Paon



٢- رتبة الدجاجيات Galliformes: تتمتع أنواعها بثنائية

جنسية، إذ يكون الذكر أكبر من الأنثى كما يكون ذو ريش ملون. من أنواع الدجاجيات نذكر الطواويس من جنس Paon والديك البري والديك الهندي والديك Lyrurus.

بعض أنواع الدجاجيات



٣- رتبة العصفوريات **Passeriformes**: تدعى هذه الرتبة برتبة جواثم الشكل وهي تضم عصافير الدوري والعنديلين و الهدد والسنونو والغربان.

٤- رتبة الطيور الجارحة **Flaconiformes**: تمتاز بأجنحة قوية وبأقدام متينة تحمل مخالب قوية تمكنها من تمزيق الفريسة، والطيور الجارحة تستطيع أن تميز فريستها عن علو شاهق، فهي حادة البصر، والمنقار عندها معقوف نحو الأسفل، تضم هذه الرتبة عدة أنواع نذكر منها الصقور والنسور.

٥- رتبة الطيور طويلة الساق (اللققيات) **Ciconiiformes**: تتصف بمنقار طويل جداً وبرقبة طويلة وأرجل طويلة، وهي طيور مهاجرة، تعتمد في غذائها على غذاء حيواني، تشتمل هذه الرتبة على عدة أنواع نذكر منها : طير اللقلق **Ciconia** وطير مالك الحزين **Aderea cinerea**.

بعض أنواع العصفوريات



Galerida cristata



pilangus sulphuratus



Calyptomena viridis



Menura superba

بعض أنواع الطيور الجارحة



بعض أنواع الطيور طويلة الساق



٦- رتبة البوميات **Strigiformes**: تمتلك البوميات عيوناً كبيرة تقع في الناحية الأمامية للرأس ومخالب طويلة وقوية، وهي مزودة بأرياش متنوعة. البوميات مجردة من الحوصلة ولكنها تمتلك معي أعور طويل ، تعشش البوميات على الأشجار وتتغذى بشكل أساسي على الفقاريات، تضم هذه الرتبة ١٢٥ نوعاً نذكر منها النوع Tyto alba والنوع Strix aluco

بعض أنواع البوميات



Strix aluco



Tyto alba

أهمية الطيور

تعد الطيور من المصادر البروتينية الهامة التي يعتمد عليها الإنسان، وذلك من حيث لحومها وبيوضها. من جهة أخرى تقضي الطيور على كثير من الحشرات والقوارض الضارة بالمحاصيل الزراعية، ولكن الطيور تنقل بعض الطفيليات إلى الحيوانات الأهلية.

صف الثدييات Mammalia

د. ماجد موسى

الصفات العامة لصف الثدييات ؟

- ١- يتألف الجسم من رأس ورقبة وجذع يحمل الأطراف، وذيل يختفي عند بعض الأنواع، ويغطي الجسم غطاء مؤلف من الشعر أو الصوف أو الفراء، وتمتلك الثدييات غداً عرقية ودهنية ولبنية.
- ٢- الدماغ أكثر تطوراً من أدمغة كل المجموعات الأخرى.
- ٣- تتميز الثدييات بتطور أليات التنظيم الحراري التي تعمل على ثبات حرارة الجسم.
- ٤- يتصف الحجاب الحاجز بأنه عضلي.
- ٥- يوجد في الأذن الوسطى ٣ عظيمات هي: المطرقة والسندان والركاب.
- ٦- تتألف المنطقة الرقبية للعمود الفقري من ٧ فقرات.
- ٧- الكريات الحمر مجردة من النوى.
- ٨- تمتلك الثدييات القوس الأبهري الأيسر، بينما اختفى القوس الأبهري الأيمن.
- ٩- الثدييات منفصلة الجنس والإلقاح عندها داخلي ويحصل التطور الجنيني في جسم الأم.
- ١٠- بعض أنواع الثدييات تعيش في الماء كما هو الحال في الحوتيات.

بنية جدار الجسم

■ يتألف الجلد عند الثدييات من بشرة Epidermis وأدمة Dermis

تتألف البشرة: من خلايا ظهارية مجردة من الأوعية الدموية وإنما تغذيها الشعيرات الدموية المنتشرة في الأدمة. تتقرن الطبقة السطحية من البشرة وتتبدل باستمرار.

أما الأدمة: فتتألف من نسيج ضام يشتمل على أوعية دموية وأعصاب، تتوضع الأدمة على نسيج ضام غني بالخلايا الدهنية يدعى بالطبقة تحت الجلد.

■ يشتمل الجلد على عدة أنواع من الغدد، هي:

□ **الغدد العرقية:** لها بنية أنبوبية، تفرز سائل يتكون من الماء وكمية قليلة من الأملاح و البولة، ويدعى بالعرق. **وظيفة هذه الغدد هي التنظيم الحراري**، وتختفي هذه الغدد عند بعض الحيوانات مثل الأرانب والكلاب والفيلة وتلجأ هذه الثدييات إلى أساليب لتحقيق عملية التنظيم الحراري.

□ **الغدد الدهنية:** هي غدد حوصلية بسيطة تنفتح في جريبات الشعر **وتفرز مادة دهنية تحافظ على مرونة الأشعار ورطوبة الجلد.**

❑ **الغدد اللبنية:** تشكلت الغدد اللبنية بتحول الغدد العرقية، ولها بنية أنبوبية حويصلية وتقوم بإفراز الحليب عند إناث الثدييات.

❑ **الغدد الدمعية:** لها بنية أنبوبية مركبة تنتج مفرزاً سائلاً يحفظ سطح العين ويجعله نظيفاً.

❑ **الغدد الصملاخية:** تقع تحت الجلد في القناة السمعية الخارجية، تفرز الصملاخ و هو سائل دهني وظيفته حماية الأذن من البكتيريا والفطريات وغيرها.

❑ **غدد الرائحة:** تفرز مواد ذات رائحة خاصة تستفيد منها الحيوانات خلال بحثها عن الجنس الآخر.

بماذا يتميز دماغ الثدييات عن دماغ الفقاريات الأخرى بتطوره المتقدم وحجمه الكبير،
وتتجلى الصفات التطورية لدماغ الثدييات بالنقاط التالية:

- ١- زيادة مساحة قشرة المخ من خلال التلافيف التي نمت جيداً عند الثدييات العليا (الرئيسيات والإنسان).
- ٢- تحقق الاتصال بين قشرة المخ والمخيخ بواسطة **عضو يدعى بالجسر Pons**.
- ٣- وجود الجسم الثفني الذي يربط نصفي الكرتين المخيتين بالإضافة إلى مثلث المخ.
- ٤- يتصف المخيخ بتطور واضح، إذ يتكون عند الثدييات من فصين جانبيين وثالث متوسط يدعى بالفص الودي.
- ٥- يوجد في الدماغ المتوسط للثدييات **٤ حذبات توأمية (فصوص بصرية)**: يشكل الشفع الأول منها مقر المنعكسات البصرية (دوران العين باتجاه المنبع الضوئي) أما الشفع الثاني فهو مقر المنعكسات السمعية (دوران الرأس باتجاه المنبه الصوتي).

أعضاء الحس

البصرية

تتصف أعضاء
البصر بأنها
ضعيفة التطور
بالمقارنة مع
الطيور

السمعية

تتصف أعضاء
الحس السمعي
بتطور جيد عند
الثدييات،
ويتمثل عضو
الاستقبال بالأذن
التي تتألف من
أذن خارجية و
وسطى وداخلية

الشمية

تتركز في الجزء
الشمي للتجويف
الأنفي، تكون
أعضاء الحس
الشمي متطورة
عند معظم الثدييات
وخاصة اللواحم
بينما تكون ضعيفة
عند الإنسان
والرئيسيات
والحيتان.

الذوقية

توجد في
مخاطية اللسان،
متطورة في
الثدييات، وتؤدي
وظائفها بشكل
أفضل مما هو
عند المجموعات
الحيوانية الأخرى
**بسبب بقاء
الطعام في
التجويف الفموي
للثدييات مدة
أطول**

المستقبلات اللمسية

تتركز في
الأماكن العارية
والرقيقة من
الجلد كالشفاه
ونهاية الخرطوم
وراحة الكف و
أخمص القدم

جهاز الدوران

الجهاز اللمفاوي؟؟؟
Lymphatic System

الأوعية الدموية


القلب



يتكون من: **١- شعريات لمفية:** يصل السائل اللمفي مع الدم بواسطة الوريد الأجوف الأمامي إلى القلب كما يأتي سائل لمفي جديد من النسج عبر سطوح الشعريات اللمفية، وتشبه الأوعية اللمفية من حيث البنية الأوردة، إلا أنّ جدرانها أرق وتحوي بداخلها عدد أكبر من الصمامات التي تعمل على سريان اللمف باتجاه واحد من الأعضاء إلى الأوعية اللمفية.

٢- الغدد اللمفية: تتوزع في مناطق مختلفة من الجسم مثل العقد اللمفية الرقبية والإبطية وتحت الفك واللويزات وغيرها، ويصدر عن كل عقدة لمفية وعاء لمفي يدعى بالوعاء الصادر، ويرد إليها وعاء لمفي يدعى بالوعاء الوارد.

الجهاز اللمفي له وظيفتان: أ- نقل جزء من المواد الغذائية إلى نسج الجسم. ب- وظيفة دفاعية: إذ تنتج الغدد اللمفية خلايا بلعمية كما تقوم بتوليد الأضداد.



يتكون من ٤ أجواف (الأذنين والبطينان)، ويحتوي صمامات تسمح بمرور الدم وتمنع عودته.

الجهاز التنفسي

الرئتين



تتوضعان في القفص الصدري
تتألف الرئة من أعداد كثيرة من
الحويصلات الهوائية التي تسمى
بالأسناخ **الرئوية** التي تزيد مساحة
السطح التنفسي للرئة، تتصف
الأسناخ الرئوية بسطوح رقيقة
تتخللها شبكة من الشعيرات
الدموية.

المجاري التنفسية

المجاري التنفسية السفلية:

تبدأ **بالحنجرة** وهي مدعمة بهيكل
غضروفي ومزودة بلسان المزمار
والحبال الصوتية،

إن فتحة المزمار تنغلق عند ابتلاع
الطعام بواسطة لسان المزمار

يلي الحنجرة **الرغامى** وهي على
شكل انبوب مجوف ومدعم
بحلقات غضروفية تمنع إغلاق
الرغامى

تتفرع الرغامى في نهايتها
الخلفية إلى قصبتين تدخل كل
منها إلى رئة حيث تتفرع إلى
قصبات تنقل الهواء إلى القنوات
الحويصلية التي تنتهي بالأسناخ
الرئوية


المجاري التنفسية العلوية:

تضم فتحتي الأنف والجوف
الشمي، ويعد البلعوم
عضواً مشتركاً بين
الجهازين التنفسي
والهضمي.

يبطن الممر الأنفي بغشاء
ظهاري مخاطي غني
بالأوعية الدموية

تكون **ظهارة الممر الأنفي**
مهدة مما يساعد على
تصفية الهواء المستنشق.

جهاز الإفراغ



يتكون من الكليتين والمجري البولية،
تتوضع الكليتان على الجدار الظهرى للتجويف
البطني،

تأخذ الكلية شكل حبة الفاصولياء،

تنتمي الكلى في الثدييات إلى صف الكلى الحوضية
تتضمن الكلية على عدد كبير من النفرونات وتكون
الأنابيب البولية في الكلية طويلة،

يتجمع البول في حويضة الكلية ومنها ينتقل إلى
المثانة البولية عبر الحالب ثم يخرج البول إلى
الوسط الخارجى من خلال مجرى بولى يدعى
بالإحليل.

الجهاز البولى التناسلى فى الثدييات

الجهاز التناسلي


الجهاز التناسلي الذكري:

يتألف من الخصى والأقنية الناقلة للنطاف والقضيب والغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري،

عدد الخصى في الذكر اثنتان، إما تتوضعان داخل التجويف البطني (كما في الحيتان والفيلة ووحيديات الثقب)، أو تهاجران دورياً إلى سطح الجسم خلال فترة التكاثر (عند أكلات الحشرات والقوارض)، أو تهاجران إلى سطح الجسم حيث تستقر بشكل دائم ضمن غلاف يدعى كيس الصفن (كما في اللواحم والرئيسيات والحافريات والجربابيات)،

يخرج من الخصية قناة ناقلة للنطاف تنتهي في قاعدة القضيب حيث تخترقه قناة بولية تناسلية تدعى بالإحليل،

يلحق بالجهاز التناسلي الذكري غدد إضافية هي:
البروستات، غدتا كوبر، الحويصلات المنوية، تقوم هذه الغدد بإفراز سائل مغذي للنطاف و ممدد لها.



الجهاز التناسلي الذكري

الجهاز التناسلي


الجهاز التناسلي الأنثوي:

يتألف من المبيضين والأقنية الناقلة للبيوض
والرحم والمهبل ثم الفتحة التناسلية
الخارجية،

يحتوي المبيض في الأنثى الناضجة على
البيوض بجميع مراحل تطورها،

أما القناة الناقلة للبيوض فتتوسع في نهايتها القريبة من المبيض مشكلة **قمع فالوب** الذي يتلف البويضة بعد إطلاقها من المبيض،

يمتد البوقان نحو الخلف ويتوسعان ليشكلا
الرحم،



الجهاز التناسلي الأنثوي

أنواع الرحم عند الثدييات؟؟؟:

الجرايبات تمتلك رحمين منفصلين يصب كل منهما بمهبل مستقل،

أما القوارض فلها رحمان يصبان في مهبل واحد،

وفي الخفافيش واللواحم فتكون نهاية الرحم الأيمن تلتحم مع نهاية الرحم الأيسر ويصبان في مهبل واحد (يدعى الرحم في هذه الحالة بالرحم ثنائي القرنة)،

أما الرحم البسيط فيوجد في القردة والإنسان وبعض أنواع الخفافيش.

يلي الرحم مهبل ينفتح للخارج بفتحة خارجية

الإلقاح والتطور: يحدث إلقاح البيضة في الثلث الأمامي من البوق (القناة الناقلة للبيوض)، ويحصل التطور الجنيني في الرحم.

تصنيف الثدييات

تحت صف الثدييات الولودة Theria

تضم ثدييات أكثر رقياً،
تتعدم عندها الصفات الخاصة
بالزواحف، وتضم فوق الرتب الحالية
التالية:

١- فوق رتبة الثدييات التوالي
(الجرايبات) Metatheria

٢- فوق رتبة المشيميات
Placentalia

تحت صف الثدييات الأولية Prototheria

تضم رتبة واحدة هي رتبة وحيدات الثقب،
تتصف أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة
بالزواحف كالتكاثر بالبيض وبنوعية البيوض
وبوجود المذرق وبالحرارة غير الثابتة،
أما الصفات الثديية فهي: وجود الوبر والغدد
الجلدية بما فيها اللبنة، ووجود ٣
عظيمات في الأذن الوسطى، و ٧ فقرات
رقبية، والبنية العضلية للحجاب الحاجز.
تتميز أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة بها:
كتحول الفكوك إلى شكل منقاري وخلوها
من الأسنان،

من نماذج هذه الرتبة: منقار البط
Ornithorynchs anatinus

١- فوق رتبة الثدييات التوالي (الجرابيات) Metatheria



توجد أنواع هذه الثدييات في أمريكا الجنوبية
واستراليا،

تتميز أنواعها بولادة الصغار بشكل غير كامل
بسبب عدم تشكل المشيمة عند أفرادها،

القضيب عند الذكور ذو شعبتين، وتمتلك
الأنثى مهبلين،

عند الإناث محفظة تقع على البطن وتصب في
الأثداء،

تأخذ الأجنة المولودة أبعاداً صغيرة إذ يبلغ طول
المولود حوالي ٣ سم ويكتمل تطوره في
المحفظة،

من أنواع الجرابيات: الكنغر طويل الذيل
والشيطان الديبي والخلد الجرابي والذئب
الجرابي.



الكنغر طويل الذنب



الشيطان الديبي *Sarcophilus harrisii*

بعض أنواع الجرابيات

تصنيف الثدييات

تحت صف الثدييات الولودة Theria

تضم ثدييات أكثر رقيماً،
تتعدم عندها الصفات الخاصة بالزواحف،
وتتضم فوق الرتب الحالية التالية:

١- فوق رتبة الثدييات التوالية (الجراييات) Metatheria

٢- فوق رتبة المشيميات Placentalia

تحت صف الثدييات الأولية Prototheria

تتضم رتبة واحدة هي رتبة وحيدات الثقب،
تتصف أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة بالزواحف كالتكاثر بالبيض وبنوعية
البيض ووجود المذرق وبالحرارة غير الثابتة،

أما الصفات الثديية فهي: وجود الوبر والغدد الجلدية بما فيها اللبينية، ووجود
٣ عظيمات في الأذن الوسطى، وسبع فقرات رقبية، والبنية العصلية
للحجاب الحاجز.

تتميز أنواع هذه الرتبة بصفات خاصة بها: كتحول الفكوك إلى شكل منقاري
وخلوها من الأسنان،

من نماذج هذه الرتبة: منقار البط Ornithorynchs anatinus

٢- فوق رتبة المشيميات Placentalia



تسمى أيضاً بفوق رتبة الثدييات الحقيقية Eutheria،

تتميز أنواع هذه المجموعة بوجود المشيمة التي تربط الجنين برحم الأم حتى يبلغ الجنين تطوره الكامل،

تضم فوق رتبة الثدييات الحقيقية ٣١ رتبة، انقرض منها ١٣ رتبة،

أهم الرتب الحالية:

١- رتبة أكلات الحشرات Insectivora:
تتغذى على الحشرات، مثل القنفذ الغربي

٢- رتبة جناحيات الجلد Dermoptera:
هي حيوانات شجرية، تتمتع بالمقدرة على الطيران

٣- رتبة مجنحات الأيدي (الخفاشيات) Chiroptera:
تتمتع بالمقدرة على الطيران، تحولت الأطراف الأمامية إلى أجنحة

٤- رتبة الرئيسيات Primates: تقسم إلى تحت الرتب التالية:

١- تحت رتبة القردة الأولية Prosimiae: ثدييات شجرية ذات نشاط ليلي ونهاري، تخلو أصابعها من المخالب، تتغذى على الحشرات والفقاريات والنباتات.

٢- تحت رتبة القردة Simiae: الوجه قصير، العيون متجهة للأمام، الدماغ كبير، حاسة الشم متراجعة، تحمل الأصابع أطفار، الرحم بسيط والمشيمة قرصية كما في الإنسان

٣- تحت رتبة البشريات Hominians

فصيلة القرود عريضات المنخرين :Ceboidea

ينتمي لها عدة أنواع نذكر منها
النوع ريسوس *Macaca mulata*
rhesus، والنوع سيبوس *Cebus*
capucinus

فصيلة القرود إنسانيات الشكل :Anthropomorphes

لها صدر مسطح وأيدي طويلة
ومشية منحنية، نمو المحفظة
الدماغية والمخ النهائي، وتطور
المقدرة الذكائية،

مثال عليها الشمبانزي: مدة الحمل
عندها ٩ أشهر ويعيش على شكل
جماعات،

مثال آخر: الغوريلا *Gorilla gorilla*
التي تعيش حياة أرضية وتمشي
مستخدمة أطرافها الأربعة.

٢- تحت رتبة القرود *Simiae*:
تقسم إلى فصيلتين:

تحت رتبة القردة الأولية Prosimiae



Lemur catta

رتبة أكلات الحشرات Insectivora



القنفذ الغربي Erinaceus europaeus

فصيلة القردة إنسانيات الشكل



الشيمبانزي *Pan troglodytes*



الغوريلا *Gorilla gorilla*

فصيلة القردة عريضات المنخرين



Macaca mulata rhesus



Cebus capucinus

٥- رتبة عديمات الأسنان Edentata:

٦- رتبة القوارض Rodentia:

٧- رتبة اللواحم Carnivora:

٨- رتبة أرنبات الشكل Lagomorpha:

٩- رتبة الخرطوميات Proboscidae:

١٠- رتبة مفردات الأصابع
Perissodactyla

١١- رتبة مزدوجات الأصابع
Artiodactyla

١٢- رتبة الحوتيات Cetacea

٢- فوق رتبة المشيميات Placentalia



تسمى أيضاً بفوق رتبة الثدييات الحقيقية Eutheria،
تتميز أنواع هذه المجموعة بوجود المشيمة التي تربط
الجنين برحم الأم حتى يبلغ الجنين تطوره الكامل،

تضم فوق رتبة الثدييات الحقيقية ٣١ رتبة، انقرض منها
١٣ رتبة،

أيضاً فوق رتبة المشيميات تضم الرتب
التالية:

رتبة عديمات الأسنان :Edentata:

تضم عدة فصائل نذكر منها: فصيلة الكسالى Bradypodidae وفصيلة أكلات النمل Myrmecophagidae

رتبة القوارض :Rodentia:

وهي ثدييات صغيرة تتميز عن غيرها من الثدييات بوجود شفع من القواطع في كل فك وبتميز العضلات الماضغة وهذا يساعد على قضم المواد القاسية، تشمل القوارض ١٨٠٠ نوع، نذكر منها الهامستر السوري Syrian hamster.

رتبة اللواحم :Carnivora:

تتغذى على اللحوم والأسماك والحشرات، مجردة من المعى الأعور، تشمل هذه الرتبة ٦ فصائل : فصيلة الدببات Ursidae كالدب البني وفصيلة الكليات Canidae كالثعلب والذئب وفصيلة القطط Felidae كالقطط والنمور والأسود

رتبة أرنبات الشكل :Lagomorpha:

ثدييات عاشبة تشبه لحد ما القوارض، ينتمي لهذه الرتبة الأرانب البرية والأهلية.

رتبة الخرطوميات :Proboscidae:

أكبر الثدييات الأرضية وزناً، يتصل الرأس بخرطوم طويل متحرك، من أنواع هذه الرتبة الفيل الإفريقي والفيل الهندي

رتبة مفردات الأصابع Perissodactyla:

يتراجع عدد أصابع هذه الرتبة وتكون محاطة بغشاء قرني، يكون عدد الأصابع مفرداً، ففي الخيول إصبع واحدة هي الثالثة، وفي الكركدن ٣ أصابع، من أنواع هذه الرتبة أيضاً التابير والحمير.

رتبة مزدوجات الأصابع Artiodactyla:

رتبة الحوتيات Cetacea:

فصيلة أكلات النمل Myrmecophagidae



رتبة القوارض Rodentia



رتبة عديمات الأسنان Edentata:

رتبة القوارض Rodentia:

رتبة اللواحم Carnivora:

رتبة أرنبات الشكل Lagomorpha:

رتبة الخرطوميات Proboscidae:

رتبة مفردات الأصابع Perissodactyla:

رتبة مزدوجات الأصابع Artiodactyla:

رتبة الحوتيات Cetacea:

يشمل كل طرف إصبعين هما الثالثة والرابعة وتزول الإصبع الأولى عند جميع الأنواع أما الإصبعان الثانية والخامسة فهما صغيرتان أو معدومتان حسب النوع، وتضم هذه الرتبة ثلاث تحت رتب هي:

تحت رتبة اللامجترات Nonruminantia:
لها معدة بسيطة أو مقسمة إلى جزئين أو ثلاثة، وتضم فصيلتين: الخنزيريات Suidae، وأحصنة النهر Hippoptamidae

تحت رتبة المجترات Ruminantia:
هي ثدييات مجترة، تتميز بمعدة مركبة وبحركة الفكين الجانبية، تضم فصيلة الوعول Giraffidae وفصيلة الزرافيات Bovidae وفصيلة البقرات

تحت رتبة خفيات الأقدام Tylopoda:
هي ثدييات مجترة، لها معدة مقسمة إلى ٤ أجواف، من أنواعها الجمل ذو السنمين Lama guanica، واللاما Camelus ferus

رتبة عديمات الأسنان :Edentata

رتبة القوارض :Rodentia

رتبة اللواحم :Carnivora

رتبة أرنبات الشكل :Lagomorpha

رتبة الخرطوميات :Proboscidae

رتبة مفردات الأصابع Perissodactyla

رتبة مزدوجات الأصابع Artiodactyla

رتبة الحوتيات Cetacea

الحوتيات حيوانات ثدية تلاءمت مع الحياة المائية، تحولت الأطراف الأمامية إلى زعانف أما الخلفية فهي ضامرة، للجسم شكل سمكي ينتهي بالزعنفة الذيلية، تحت الجلد طبقة شحمية سمكها حوالي ٥٠سم، توجد الفتحات الأنفية أو الفتحة الأنفية الواحدة في الناحية السطحية للرأس ولها فقط وظيفة تنفسية، تقسم هذه الرتبة إلى تحت ربتين:



تحت رتبة الحيتان ذوات الصفائح
:Mysticeti

تمتلك أسناناً في المرحلة الجنينية فقط،
عندها فتحتان أنفيتان، من أنواعها: الحوت
الرمادي Balaena mysticetus

تحت رتبة الحيتان ذوات الأسنان
:Odontoceti

تمتلك عدد كبير من الأسنان، لها فتحة
تنفسية واحدة، من أنواعها: الدلفين العام
Phyter Delphinus delphis
macrocephalus

شعبة الديدان Helminthes

د. ماجد موسى

شعبة الديدان Helminthes

تحت شعبة الديدان المسطحة
Platyhelminthes

صف المهترزات
Turbularia

صف وحيدات الجيل
Monogenia

صف المثقوبات
Trematoda

صف الديدان الشريطية
Cestoda

تحت شعبة
النيميرت
Nemertina

تحت شعبة الديدان المسودة
(الخييطية)
Nemathelminthes

صف الممسودات
Nematoda

تحت شعبة
الدورات
Rotifera

تحت شعبة الديدان
الحلقية
Annelida

صف قليلات الأشعار
Oligochaeta

صف كثيرات الأشعار
Polychaeta

► تحت شعبة الديدان المسطحة **Platyhelminthes**

تعيش حياة حرة في المياه البحرية والعذبة والتربة، وبعضها لها حياة طفيلية (على الإنسان والحيوان)،

وتتصف بما يلي:

- ✓ جسمها متسطح بالاتجاه الظهري البطني
- ✓ وجود غطاء جلدي عضلي يحيط بالجسم
- ✓ ينعلم عندها الجوف العام وتوجد الأعضاء ضمن النسيج البرامشي الذي يشغل الفراغات بين الأعضاء
- ✓ بعض أنواعها له جهاز هضم بدائي مجرد من الشرج (تمتلك فم لدخول الطعام وخروج الفضلات)، أما بعض الأنواع فلا تمتلك جهاز هضم.
- ✓ جميع الديدان المسطحة ينعلم عندها جهاز التنفس وجهاز الدوران.
- ✓ الجهاز العصبي عبارة عن عقدة عصبية واحدة يصدر عنها حبال عصبية تمتد للخلف.
- ✓ معظمها حيوانات خنثوية والإلقاح عندها داخلي
- ✓ الأشكال الطفيلية منها تمتلك محاجم لتثبيت الديدان في المضيف.

تصنيف تحت شعبة الديدان المسطحة

► تقسم هذه المجموعة إلى الصفوف التالية:

✓ صف المهترزات Turbellaria

✓ صف المثقوبات Trematoda

✓ صف الديدان الشريطية Cestoda

صف المهترات Turbelaria



بلاناريا الماء العذب
Planaria tigrina

▶ جهاز الهضم:

فم (ينفتح في وسط الوجه البطني للدودة) يتصل الفم ببلعوم ينتهي بأمعاء مسدودة

▶ جهاز الإفراغ: كلى أولية

▶ الجهاز العصبي: عقدتين - حبلان عصبيان متفرعان

▶ التكاثر: المهترات حيوانات خنثوية تتكاثر بطريقتين: ١-

جنسياً (بالقاح البيوض فتتشكل بيضة ملقحة تخرج للوسط الخارجي وتتطور إلى يرقة سباحة تدعى يرقة مولر التي تتطور إلى فرد بالغ). ٢- **لاجنسياً** بطريقة الانقسام العرضي.


▶ الحركة: تسبح بعضها بواسطة تموجات الجسم، وبعضها

الأخر بواسطة الأهداب المهترزة الموجودة في ظهارة الجسم.

▶ مثال على المهترات: بلاناريا الماء العذب Planaria

tigrina

منغرسة



صف وحيدات الجيل Monogenia

- ▶ تتطفل خارجياً على الأسماك، وبعضها يتطفل على الرئتين والمثانة للبرمائيات والزاحف
- ▶ تشمل عضو للتثبيت في نهايتها الخلفية
- ▶ أبعادها ٠.١٥ - ٢٠ مم.
- ▶ الجهاز العصبي: عقدة عصبية في المنطقة الرأسية، يتفرع عنها ٦ حبال عصبية تتجه للخلف وتتصل مع بعضها بواسطة ضفائر عصبية
- ▶ جهاز الهضم: فم في مقدمة الحيوان يتصل ببلعوم يؤدي إلى الأمعاء.
- ▶ جهاز الإفراغ: مكون من كلى أولية (ابتدائية)
- ▶ **وحيدات الجيل ديدان خنثوية والإلقاح ذاتي**، تخرج البيوض الملقحة إلى الماء وتتطور متحولة إلى يرقة مهدبة تحتوي عضو تثبيت متطور وشفعين من العيون ومعي وكلى ابتدائية، ثم تثبت على جسم المضيف وتتطور إلى دودة بالغة
- ▶ **أما وحيدات الجيل ذات التطفل الداخلي كالوريقة** الضفدية *Polystoma integerrimum* التي تتطفل على مثانة الضفادع، فإن اليرقة تثبت بغلاصم الشراغيف ثم تصل للأمعاء من خلال التجويف الفموي ثم إلى المذرق حيث يتم نضجها.

الطور اليرقي



الطور البالغ





Рис. 211. Мнорогер (Polystoma integerrimum).


صف المثقوبات Trematoda

- ▶ لها شكل ورقي أو متطاوّل
- ▶ متطفلة على الفقاريات
- ▶ طول الجسم عدة ميليمترات حتى ٣ سم
- ▶ تملك محجمين للتثبيت على العائل (أمامي وبطني)
- ▶ دورة الحياة تتطلب وجود عائل (مضيف) متوسط واحد أو اثنين من الرخويات، بعض أنواعها تحتاج مضيف واحد
- ▶ من أنواعها المتورقة الكبدية *Fasciola hepatica* و متفرعة المعى المغصنة *Dicrocoelium dendriticum*



▶ المتورقة الكبدية *Fasciola hepatica*:

- تتطفل على الأقنية الصفراوية لكبد الأغنام والماشية والأرانب، نادراً ما يصيب الإنسان
- يأخذ الجسم شكلاً ورقياً طوله ٢ - ٥ سم
- لها محجم فموي في مقدمة النهاية الأمامية للجسم أما المحجم البطني فألى الخلف قليلاً
- فتحة التناسل توجد بين المحجمين
- الفتحة الإفراغية في نهاية الجسم
- يحيط بالجسم ظهارة منغرسية مجردة من الأهداب بسبب الحياة الطفيلية التي تعيشها هذه الديدان.



المتورقة الكبدية

□ **الجهاز العصبي:** مكون من عقدتين عصبيتين من الناحية الأمامية للجسم، تتصلان ببعض بواسطة طوق عصبي،

□ أعضاء الحس غير موجودة عندها بسبب حياتها الطفيلية.

□ **جهاز الهضم:** الفم يقع في منتصف المحجم الأمامي ويصل مع بلعوم عضلي الذي يتصل مع معي ينقسم إلى ردين معويين يمتدان على جانبي الجسم نحو الخلف

□ تكون نهايات الأمعاء عند المثقوبات مغلقة (مجردة من الشرج) وتخرج فضلات الجسم من الفم.

□ يحصل **التنفس** بالطريقة اللاهوائية (بالتخمر) بسبب حياتها الطفيلية الداخلية حيث لا يوجد أكسجين، أما اليرقات الحرة فتحصل على الأكسجين من الوسط المحيط بطريقة الانتشار عبر جدار الجسم.


□ **جهاز الإفراغ:** مؤلف من قناة بولية رئيسية (بعض الأنواع قناتين) تمتد للخلف، يصدر عنها فروع دقيقة تتوزع في كل أنحاء الجسم.

□ **الجهاز التناسلي:** الديدان المثقوبة ديدان خنثوية، وتشتمل على الجهازين التناسليين الأنثوي والذكري.

❖ تتكاثر **الخلايا المنتشة** الموجودة في كيسة الأبواغ وتتطور إلى **ريديات**.

❖ تخرج الريديات من كيسة الأبواغ وتصل إلى **كبد الحلزون** حيث تتطور إلى أجنة جديدة تدعى **بالذوانب**،

❖ تخرج الذوانب من الريديا وتعبر نسج الحلزون متوجهة إلى الماء حيث تسبح لفترة وجيزة ثم **تصل إلى منطقة عشبية** خارج الماء حيث تفقد ذيلها وتتحول إلى طور **الجنين المتكيس** وعندما يبتلع المضيف الأساسي (**الأغنام مثلاً**) هذا الجنين مع الأعشاب، ينحل غلاف الجنين المتكيس في القناة الهضمية وتخرج منه دودة فتية تهاجر إلى الأقنية الصفراوية وتثبت فيها وتتحول إلى دودة بالغة.



► متفرعة المعى المغصنة

Dicrocoelium dendriticum

تتطفل على الأغنام وبعض الثدييات الأخرى

تعيش متطفلة على الأقنية الصفراوية للكبد


العائل المتوسط الأول هو الحلزون

العائل المتوسط الثاني النمل

البنية الداخلية تشبه المتورقة الكبدية ماعدا
المعى والرحم

حلقة التطور:

- البيوض الملقحة تخرج من الفتحة التناسلية للديدان المتطفلة على الأقنية الصفراوية للمضيف الأساسي،
- ثم تصل مع الصفراء إلى أمعاء المضيف الأساسي ثم تخرج مع البراز،
- عند وصول البيوض للماء يبتلعها المضيف المتوسط الأول (رخوي) حيث يتفكك جدار البيضة في أمعائه ويخرج منها جنين مهذب يصل إلى كبد الرخوي حيث يتكيس متحولاً إلى كيسة أبواغ تحوي خلايا منتشة تتطور إلى يرقات جديدة تدعى بالريديات تحوي بداخلها ذوانب،
- تخرج الذوانب من الفتحة التنفسية للرخوي إلى الوسط الخارجي، وحين تقع على الأعشاب يتناولها المضيف المتوسط الثاني (وهو النمل) فتتحول هذه اليرقات في جوف البطن إلى أجنة متكيسة
- عندما تتناول العوائل النهائية الأغذية الملوثة بالنمل يتم هضم النمل وتتحلل اليرقات من الكيسات وتصل إلى الأقنية الصفراوية للكبد حيث تتحول إلى ديدان بالغة.



قد يصاب الإنسان بهذه الديدان إذا تناول خضروات ملوثة بهذا النمل

المنشقات Schistosoma ►




◦ منشقات الجسم الدموية Schistosoma haematobium
تدعى ببهارزيا المجاري البولية، تصيب الإنسان



◦ منشقات الجسم المانسونية (بهارسيا المستقيم) Schistosoma mansoni
تدعى ببهارزيا المستقيم، تتطفل على الإنسان، تشبه لحد كبير منشقات الجسم الدموية

صف الديدان الشريطية (القليديات) Cestoda



- ▶ تعيش طفيلية في أمعاء الفقاريات.
- ▶ الجسم طويل مسطح شريطي الشكل
- ▶ يتألف الجسم من رأس وعنق وعدة حلقات عددها بين ٣ إلى عدة مئات
- ▶ يحمل الرأس محاجم وأحياناً عقائف تزيد من شدة التثبيت
- ▶ مجردة من الفم وجهاز الهضم
- ▶ تشتمل الحلقات الناضجة على أجهزة التناسل
- ▶ هذه الديدان حيوانات خنثوية

البنية الداخلية والوظائف الحيوية للديدان الشريطية

- ▶ **الجهاز العصبي:** ضعيف التطور بسبب تطفلها الداخلي، يتكون من عقدتين عصبيتين رأسيّتين وعدة أشعاع من الحبال العصبية
- ▶ **أعضاء الحواس:** غير موجودة، وتستقبل المنبهات بواسطة خلايا حسية منتشرة في جسم الدودة.
- ▶ **الجهاز الحركي:** حركة بطيئة داخل جسم المضيف بواسطة العضلات الدائرية والطولية الموجودة في أجسامها.
- ▶ **نقل المواد والتنفس:** تتم بطريقة الانتشار عبر سطح الجسم، التنفس لاهوائي.
- ▶ **الجهاز الإفراغي:** من النمط البدائي (كلية أولية وأقنية إفراغية تنتهي بالفتحة الإفراغية)
- ▶ **جهاز الهضم:** يندمج في الديدان الشريطية، وتمتص المواد المهضومة في أمعاء المضيف عبر سطح الجسم بطريقة الانتشار.
- ▶ **الجهاز التناسلي:** ديدان خنثوية وتشتمل على الجهازين التناسليين الأنثوي والذكري

▶ الالقاح والتطور عند الديدان الشريطية :

▶ يتم الإلقاح في الحلقات البالغة وذلك بين دوتين (إلقاح متبادل) حيث توجد أكثر من دودة في معي المضيف،

▶ أو يحصل بين حلقتين بالغتين في الدودة الواحدة،

▶ أو يحصل ذاتياً في حلقة واحدة بالغة.

▶ يحصل تطور البيضة الملقحة إلى يرقة تسمى بالجنين السداسي الأشواك الذي يمتلك ٦ عقائف، يتابع هذا الجنين تطوره في المضيف (العائل) المتوسط، وقد يحتاج تطور بعض الأنواع إلى مضيفين متوسطين.

تصنيف صف القليديات (الديدان الشريطية)

يحتوي هذا الصف عدة رتب نذكر منها:

▶ رتبة ذوات الممصات الكاذبة *Pseudophyllidae*

تدعى أيضاً بالديدان محفورات الرأس

العوساء العريضة *Diphyllobothrium latum*

طولها ١٠-١٢ متر،

تحتوي ٣٠٠٠-٤٠٠٠ حلقة،

الإنسان واللواحم هم العوائل النهائية لهذه الديدان،

أما العوائل المتوسطة الأولى فهي القشريات،

أما العوائل المتوسطة الثانية فهي الأسماك النهرية

رتبة دائريات الممصات (دائريات) Cyclophyllidae (المحاجم)

منها: الدودة الشريطية الوحيدة (الشريطية)
Taenia solium (المسلحة)



طولها ٢-٤ متر،

رأسها مجهز بـ ٤ محاجم،

يلي الرأس حلقات فتية تخلو من أجهزة التناسل
يليها حلقات ناضجة تحوي أجهزة تناسل ذكرية
وأنثوية ثم حلقات كهلة تمتلئ بالبيوض الملقحة.

تخرج الحلقات الكهلة للخارج خلال التغوط
وتتفسخ وتخرج منها البيوض الحاوية على الأجنة
سداسية الأشواك،






عندما يتناولها الخنزير تنحل قشور هذه البيوض
ويخرج منها جنين سداسي الأشواك الذي يخترق
الأوعية الدموية للأمعاء ويصل عبر الدورة
الدموية إلى العضلات ويستقر فيها حيث يتحول
ليرقة متحوصلة (تدعى بالكيسة المذنبة) يمكن أن
تبقى لعدة سنوات




وحين يأكل الإنسان لحم الخنزير الملوث بها
النبيء أو غير مطهو جيداً تصل هذه الكيسة
المذنبة لأمعائه ويتحرر الرأس ويتثبت بجدران
المعي الدقيق ويتحول لدودة بالغة


Diphyllobothrium latum دورة حياة العوساء العريضة



Taenia solium (الشريطية الوحيدة) (الشريطية المسلحة)



الدودة الشريطية العزلاء :Taenia saginata




□ تتطفل على المعى الدقيق للإنسان الذي يعتبر المضيف النهائي لهذه الدودة،

□ طولها ٨ - ١٠ متر، عدد حلقاتها ٢٠٠٠


□ يحمل الرأس ٤ محاجم وليس له عقائف

□ تنفصل حلقاتها من جسم الأم وتستطيع بتقلصات العضلية أن تخرج بين فترات التغوط وخلالها أما الشريطية الوحيدة فلا تطرح إلا على شكل حلقات متصلة ومع البراز غالباً،


□ دورة حياتها تشبه دورة الحياة في الشريطية الوحيدة إلا أن المضيف المتوسط في العزلاء هو **البقر** وليس **الخنزير**.



الدودة المشوكة الحبيبية Echinococcus granulosus



- تتطفل على اللواحم كالكلاب والذئاب والثعالب وغيرها وهذه الحيوانات تشكل العوائل النهائية،
- العوائل المتوسطة لهذه الدودة هي الإنسان والعواشب،
- طول الدودة ٤ - ٦ مم،




- لها رأس و ٤ محاجم، يلي الرأس عنق و ٣ حلقات (الأولى فتية تخلو من أجهزة التناسل، الوسطى ناضجة وتحتوي على الجهازين التناسليين الذكري والأنثوي ، أما الحلقة الثالثة والأخيرة فهي كهلة وتحتوي الرحم الذي يحتوي على البيوض الملقحة)

دورة حياة الدودة المشوكة الحبيبية :


يلتهم الإنسان أو الحيوان العاشب طعاماً ملوث بالبيض الملقة،

تتحل قشرة البيضة ويخرج منها جنين سداسي الأشواك يخترق جدار الأمعاء وينتقل بواسطة الدورة الدموية إلى بعض أعضاء الجسم كالکبد والرئتين والطحال والدماغ حيث يتثبت ويكوّن كيسة عارية (كيسة مائية) تنمو حتى يصبح قطرها ٥-١٠ سم يمكن أن تبقى عدة سنوات،

تجدر الإشارة إلا أنه يمكن للبيض الملقة أن تصل للإنسان عندما يلامس شعر الكلب الذي يحوي هذه البيض.




ثنائية الفوهات الكلبيّة **Diphylidium Caninum**



- ✓ تتطفل على الأمعاء الدقيقة للكلاب والقطط ونادراً الإنسان (وهي العوائل النهائية)،
- ✓ أما العوائل المتوسطة فهي البراغيث وقمل الرأس ،
- ✓ طول الدودة ٢٠ - ٤٥ سم،
- ✓ على رأس الدودة ٤ محاجم وحيزوم يحمل على قمته ٣-٤ صفوف من العقائف،
- ✓ تحتوي الحلقة الناضجة على جهاز تناسل مزدوج ومتناظر جانبيّاً وفتحتين تناسليتين جانبيتين.



Diphylidium Caninum دورة حياة ثنائية الفوهات الكلبية



تطرح الحلقات الكهلة المليئة بالبيوض للوسط الخارجي مع براز الكلب،

تلتهم يرقات البراغيث هذه البيوض الحاوية على الأجنة سداسية الأشواك والتي تتحول إلى يرقة تسمى الكيسانية المذنبة،

عندما تلتهم الكلاب أو القطط البراغيث الملوثة باليرقات الناضجة تصل اليرقات إلى الأمعاء ويبرز رأسها ويتثبت في أمعاء المضيف النهائي لتتحول إلى دودة بالغة

تحت شعبة الديدان الممسودة (الخييطية) Nemathelminthes

نتصف بالصفات العامة التالية:

- ▶ بعضها حر (في المياه العذبة أو البحرية أو التربة) والآخر طفيلي (تتطفل على الإنسان والحيوان والنبات)
- ▶ شكل الجسم خيطي أو حبلي وغير مقسم إلى حلقات
- ▶ الجهاز العضلي أكثر تطوراً من الديدان المسطحة
- ▶ تحوي جوف أولي وهو عبارة عن شقوق بين الأعضاء الداخلية
- ▶ أنبوب هضمي (فم، بلعوم، مري، معي متوسط، معي خلفي، الشرج)
- ▶ لا يوجد أجهزة تنفس أو دوران
- ▶ الجهاز الإفراغي من النمط الكلوي الابتدائي
- ▶ الجهاز العصبي أكثر تطوراً من الديدان المسطحة

تصنيف تحت شعبة الديدان الممسودة

▶ صف الممسودات *Nematoda*


- شعرية الرأس *Trichocephalus trichiura*
- الحرقص (السرمية الدويدية) *Enterobius vermicularis*
- حيات البطن (الصفير الخراطيني أو الأسكاريس) *Ascaris lumbricoides*
- الملقوة العفجية *Ankylostoma duodenale*
- الشعرينة الحلزونية *Trichinella spiralis*




الحرص (السرمية الدويدية) *Enterobius vermicularis*



شعرية الرأس *Trichocephalus trichiura*



حيات البطن (الاسكاريس) *Ascaris lumbricoides*



الملقوة العفجية *Ankylostoma duodenale*



الشعرينة الحلزونية *Trichinella spiralis*

الأنواع المتطفلة على النباتات

دودة درنات البطاطا *Heterodera rostochiensis* ▶





دودة جذر الشمندر *Heterodera Schachtii*



Ditylenchus destructor دودة ساق البطاطا



دودة عفن القمح *Anguina tritici*

دودة البصل *Ditylenchus alii*

► تسبب توقف نمو النبات (البصل أو الثوم)



تحت شعبة الدورات Rotifera



- الجسم قصير
- يقسم إلى ثلاثة أجزاء: المقدمة، الجذع، الرجل الملقطية.
- في مقدمة الجسم إكليان من الأهداب تحيطان بالفم
- الرجل تشبه الملقط وتستخدم للقبض على الفريسة
- بعض أنواعها تعيش في المياه العذبة وبعضها الآخر في المياه البحرية

تحت شعبة الديدان الحلقية Annelida

تتصف بالصفات العامة التالية:

- ▶ يتصف الجسم بالتناظر الجانبي
- ▶ طولها ٠.٥ مم حتى ٣ أمتار
- ▶ معظم أنواع الحلقيات تعيش في المحيطات والبحار والمياه العذبة والأماكن الرطبة
- ▶ جهاز الهضم أنبوبي وكامل
- ▶ جهاز الدوران من النمط المغلق
- ▶ جهاز الإفراغ يتكون من كلى تالية
- ▶ التنفس من خلال سطح الجسم أو بالغلاصم عند بعض الأنواع
- ▶ الجهاز العصبي مكون من شفع من العقد العصبية الدماغية أو من طوق عصبي حول البلعوم متصل بجذع عصبي بطني مزدوج أو مفرد مع وجود عقدتين أو عقدة عصبية واحدة في كل حلقة.
- ▶ الديدان المتطورة خنثوية أما الديدان البدائية فهي منفصلة الجنس

تصنيف تحت شعبة الديدان الحلقية



▶ صف قليات الأشعار :Oligochaeta:

مثال: دودة الأرض Lumbricus terrestris

▶ صف كثيرات الأشعار :Polychaeta:



• تحت صف كثيرات الأشعار المتنقلة Errantia

• تحت صف كثيرات الأشعار المقيمة Sedantaria

▶ صف العلقيات (عديمت الأشعار) :Hirudinea:

مثال: العلق الطبي: Hirudo medicinalis

يفرز مادة الهيرودين المضادة لتخثر الدم



انتهت المحاضرة