الجمهورية العربية السورية

جامعة حماة

كلية الطب البيطري

قسم الأحياء الدقيقة

عزل جراثيم الليسترية من الحليب والجبن في محافظة دير الزور

رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية اختصاص

الأحياء الدقيقة

إعداد طالب الدراسات العليا

مصطفى خالد الخضر

إشراف

الأستاذ الدكتور ناجح هبره

1445 هـ - 2023 م

* شهادة *

أشهد بأن العمل الموصوف في هذه الرسالة هو نتيجة بحث قام به المرشح الطالب مصطفى خالد الخضر تحت إشراف الدكتور ناجح هبره الأستاذ في قسم الأحياء الدقيقة في كلية الطب البيطري في جامعة حماة وأي رجوع إلى بحث آخر في هذا الموضوع موثق في النص .

المشرف العلمي

أ.د ناجح هبره

المرشح

مصطفى خالد الخضر

حرر في / /

* Certificate *

It is hereby certified that the work described in this thesis is the result of the author' s own investigation Dr. Mustafa Khaled Al khuder under the supervision of the professor Dr.Najh Habra in the department of Microbiology at the faculty of veterinary medicine , ALHama University .And any reference to other researcher work has been acknowledged in the paragraphs .

Date / /

Candidate

Mustafa Khaled Al khuder

Supervisors

Prof.. Dr. Najh Habra

قرار لجنة الحكم والمناقشة

استناداً إلى قرار مجلس الشئون العلمية بجامعة حماة رقم (٤٨٢) المتخذ بالجلسة رقم (٢٣) للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ المتعددة بتاريخ /١٤/ محرم ١٤٤٥ هـ والموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣ القاضي بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير للطلاب مصطفى الخضمر بعنوان :

عزل جرثيم الليستيرية من الحليب والجبن في محافظة دير الزور *

وبعد عرض الرسالة وسردها ومناقشتها ،اجتمعت لجنة الحكم والمناقشة بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣ وبعد التداولة قررت اللجنة ترشيح طالب الدراسات العليا مصطفى الخضمر لتبيل درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية اختصاص (الأحياء الدقيقة) بتقدير عام (جيد جداً) ودرجة (٧٦.٠٢) ،
وتوصي اللجنة بصرف تكاليف طباعة الأطروحة على نفقة الجامعة نظراً للجهد الذي بذله الطالب والتكاليف التي تكبدتها إضافة إلى تناوله موضوعاً حساساً من الناحية الاقتصادية في القطر .

أعضاء اللجنة :

- أ.د. عهد الكريم قلب اللوز
اختصاص أمراض —————
كلية الطب البيطري - جامعة حماة
- أ.د. ناجح هبيرة
اختصاص تشايل وتشخيص مخبري
كلية الطب البيطري - جامعة حماة
- د.أ.شرف السصالح
اختصاص علم الجرثيم العام
كلية الطب البيطري - جامعة حماة

التوقيع

Syrian Arab Republic
Hama Universit
Faculty of Veterinary.-Medicine

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماة
كلية الطب البيطري

هاتف : ٢٤١٠٢٨٠ - ٢٤١٠١٤١ - ٠٠٩٦٣٣٣
فاكس : ٠٠٩٦٣٣٣
بريد الكتروني : vet.med@hmu.sy
التصنيف :
التاريخ :
الموضوع :

الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب البيطري

بعد الإطلاع على الأطروحة المعدلة من رسالة الماجستير المقدمة من قبل المرشح لتول درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية طالب الدراسات العليا مصطفى الخضر في قسم الأحياء الدقيقة اختصاص (الأحياء الدقيقة) بعنوان:

" عزل جراثيم التيسرية من الحليب والجبن في محافظة دير الزور "

تفديكم بأن الأطروحة بشكلها الحالي قد استوفت التعديلات التي أشارت لها لجنة الحكم والمناقشة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣ لمناقشة الرسالة، ونعتبر أن الرسالة بهذه الصورة جاهزة للطباعة بشكلها النهائي.

جامعة حماة
كلية الطب البيطري
رقم
التاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٢

يرجى التكرم بالإطلاع

٢٠٢٣ / /

رئيس اللجنة
أ.د. عبد الكريم قيب التوز

عضو
أ.د. ناجح عبدة

عضو
د. أشرف الصالح

رئيس قسم الأحياء الدقيقة
الأستاذ الدكتور عبد الكريم الخالد

مصادق
الأستاذ الدكتور عبد الكريم قيب التوز

تصريح

أصرح بأن هذا البحث والذي هو بعنوان (عزل جراثيم الليستيرية من الحليب والجبن في محافظة دير الزور) لم يسبق أن قبل للحصول على أية شهادة ولا هو مقدم حالياً للحصول على شهادة أخرى .

التاريخ

/ /

المرشح

مصطفى خالد الخضر

DECLARATION

It is hereby declared that this work (Isolation of Listeria from milk and cheese's in the Governorate of Der-Alzoor) has not been accepted already for any degree , nor is being submitted concurrently for any other degree.

Date

/ /

Candidate

Mustafa Khaled Al khuder

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ﴾ التوبة 105

صدق الله العظيم

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
13	المقدمة
17	أهداف البحث
17	اهمية البحث
18	الدراسة المرجعية
19	داء الليستيرية
19	خطورة المرض
21	العامل المسبب
22	الخواص الشكلية لجراثيم الليستيرية
22	الخواص المزرعية لجراثيم الليستيرية
23	الخواص الكيمياء حيوية لجراثيم الليستيرية
23	الأعراض التي تسببها جراثيم الليستيرية
23	انتشار داء الليستيرية
27	وبائية داء الليستيرية
27	مصدر ومخزن الخمج لداء الليستيرية
27	طرق انتقال مرض الليستيرية
28	الامراضية الخاصة بجراثيم الليستيرية
29	المواد وطرائق العمل
30	المواد المستخدمة في الزرع والعزل الجرثومي والاختبارات البيوكيميائية
31	الأجهزة اللازمة للبحث
31	طرائق البحث
31	طريقة جمع العينات
32	الزرع الجرثومي
32	دراسة الخواص الشكلية
33	اختبار تحلل الدم
33	اختبار الحركة
33	اختبار الكاتلاز
33	اختبار أوكسيداز
34	اختبار أحمر الميثيل
34	اختبار فوكس بروسكاور
34	اختبار كامب
35	اختبار الأندول

35	اختبار تخمير السكريات
35	اختبار حساسية العزولات للمضادات الحيوية
37	النتائج
39	صور لجراثيم الليسترية
40-41	نتائج عزل جراثيم الليسترية من الحليب
42-43	نتائج عزل جراثيم الليسترية من الأجبان
44	نتائج الاختبارات الكيمياء حيوية
45	نتائج اختبار الحساسية
46	المناقشة
49	الاستنتاجات و التوصيات
52	الملخص العربي
53	الملخص الأجنبي
54	المراجع

فهرس الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
30	جدول يمثل العينات المدروسة	1
38	نتائج عزل جراثيم الليسترية على العينات المدروسة	2
40	نتيجة عزل جراثيم الليسترية من حليب الأبقار	3
41	نتيجة عزل جراثيم الليسترية من حليب الأغنام	4
42	نتيجة عزل جراثيم الليسترية من أجبان الأغنام	5
43	نتيجة عزل جراثيم الليسترية من أجبان الأبقار	6
44	نتيجة الاختبارات الجرثومية والكيمياء حيوية لجراثيم الليسترية	7
45	نتيجة اختبار الحساسية	8

فهرس المخططات

الصفحة	عنوان المخطط	الرقم
40	مخطط يمثل جراثيم الليسترية في حليب الأبقار	1
41	مخطط يمثل جراثيم الليسترية في حليب الأغنام	2
42	مخطط يمثل جراثيم الليسترية في أجبان الأغنام	3
43	مخطط يمثل جراثيم الليسترية في أجبان الأبقار	4

فهرس الصور

الصفحة	العنوان	الرقم
39	نمو جراثيم الليسترية على منبت بالاكام	1
39	نمو جراثيم الليسترية على منبت أوكسفورد	2
39	جراثيم الليسترية بعد عملية التنقية على منبت أوكسفورد	3
39	تخمير السكاكر لجراثيم الليسترية	4

فهرس الاختصارات

الاختصار	الاسم الانكليزي	الاسم العربي
MR	Methyl Red	أحمر الميثيل
VP	Voges-proskauer	فوكس بروسكاور
IN	Indol	الاندول
HLY	Hemolysin	التحلل الدموي
MOT	Motility	الحركة
CAT	Catalase	الكاتلاز
OXID	Oxidase	الأوكسيداز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء:

* إلى من سجدت له الجباه وخنعت له رقاب المجابرة خوفاً وتضرعاً وطمعاً بعفوه وكرمه

إلى من فاضت له العيون بعبرتها . . . إلى من خشعت له القلوب

إلى من وعد عباده وبشر الصابرين على صبرهم بفرح قريب سبحانه الله الكريم

إلى من تآقت له الأمراح واشتأقت له النفوس لتقف بين يديه الرحمن الرحيم

إلى خالق الكون رب السموات والأرض ورب العرش العظيم الله جل جلاله

* إلى سيد البشرية وخير البرية . . . إلى مهدي البشرية الذي بعث بالحق رحمة للعالمين

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

*إلى النور الذي أبصر به وسندي في الحياة . . . إلى من ينبض قلبي بوجودها

إلى من علمتني معنى الصبر والعطاء . . . إلى من كانت لي بمثابة كل شيء

إلى من اعتبرها أعز ما في الوجود . . . إلى الشمعة التي تحترق لتضيء من حولها

إلى من قاسمتني حياتي بجلوها ومرها . . . إلى من وقفت بجانبتي وساندتني بكل مواقف الحياة

إلى الدوحة العظيمة . . . إلى من كانت لها كل الفضل . . . إلى من وهبتني الكثير الكثير ولم أهبها إلا القليل

. . . إلى من أكن لها كل الاحترام والتقدير التي لولا تحفيزها لما وصلت إلى النجاح

إلى والدتي الغالية المعلمة الفاضلة كفاء جنيد أطل الله بعمرها

*إلى من غاب عن ناظري واشتأقت له مروحي . . . إلى من تعلمت منه معنى الشجاعة

إلى من كان له الفضل علي . . . إلى من حرمتني الدنيا كلمة أبي

إلى من ترأى لي طيفه من بعيد وتمنيت أن يكون موجود بيننا لأنرف له خبر نجاحي

ولكن موعدي معك في جنان الخلد . . . إلى مروح والدي المرحوم خالد الخضر

*إلى من أكن لهم الاحترام والتقدير . . . إخوتي محمد الخضر، المهندسة مروى الخضر

إلى الزهور التي عطرت جو أسرتنا . . . إلى ضحكة الحياة وهجتها

إلى أمل المستقبل حنين، مصطفى، لين

مصطفى

شكر وتقدير

أقدم جزيل الشكر والعرفان بالجميل إلى مشرفي وأستاذي وقدوتي في العلم
الأستاذ الدكتور ناجح هبيرة للتوجيه الدائم وعلى نصائحه القيمة.

شكر وتقدير

إلى رئيس جامعة حماه أ. د. عبد الرزاق سالم

وإلى أ. د. سامر إبراهيم نائب رئيس جامعة حماه

وإلى كلية الطب البيطري وجميع العاملين فيها وأخص بالذكر

أ. د. عبد الكريم قلب اللوز عميد كلية الطب البيطري

والسادة الوكلاء أ. د. موفق جنيد ، د. مرهف ملحج

وإلى د. أشرف الصالح

وإلى أ. د. عبد الكريم الخالد رئيس قسم الأحياء الدقيقة

والله ولي التوفيق

مصطفى خالد الخضر

المقدمة والأهداف

Introduction

&

Objectives

1- المقدمة Introduction:

قال الله تعالى:

((وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون)).
((وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين)).

إنّ نعم' الله تعالى على الإنسان نعم' كثيرة لا تعد ولا تحصى ومن نعمه علينا عز وجل أنه سبحانه وتعالى جل جلاله قد سخر لنا الأنعام لنستفيد من حليبها ولحمها وصوفها وغيرها من هذه الفوائد العظيمة سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم.

وأىّ مادة غذائية سواء أكانت الحليب، الألبان أو اللحوم تعد عرضة للتلوث البكتيري حيث تستطيع العديد من الجراثيم أن تغزو هذه المادة الغذائية مسببة أمراضاً خطيرة جسيمة ملحقة بالكائن الحيّ ومن بين هذه الجراثيم جراثيم الليستيرية التي تعد من أخطر الجراثيم لما تسببه من أمراض فتاكة سواء أكانت عند الإنسان أو الحيوان.

ينتشر مرض الليستيرية بكثرة في الطبيعة مصيباً الإنسان وأنواع عديدة من الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور، وتشكل بعض الحيوانات القارضة المصابة بالمرض إصابة خفية مصدراً هاماً للعدوى حيث يمكنها أن تحدث وبائية كبيرة للمرض في الحيوانات الأهلية، ويعتبر المرض من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، وكذلك تحدث تسممات دموية في الحيوانات الحديثة الولادة خاصة، إضافة إلى التهابات الرحم وإجهاضات والتهاب الضرع المزمن (الرفاعي والعمر، 2007).

الليستيرية وحيدة النواة جراثيم ايجابية الغرام، هوائية لاهوائية مخيرة تتواجد في أماكن متعددة وتعتبر من المسببات المرضية الهامة للعديد من الحيوانات (Jones, 1988;)
(Chasseignaux et al., 2001).

كما يمكن أن تنتشر هذه الجراثيم في الطبيعة والبيئة المحيطة كالتربة والماء والنباتات (البنبي وزملاؤه، 2016).

وتحدث العدوى عن طريق (الاحتكاك، الأوساخ ، الأطعمة الملوثة) ولا تنتقل العدوى من إنسان إلى آخر حيث يصاب الإنسان بهذه العصابات محدثة التهابات السحايا والمخ وكذلك إجهاض النساء الحوامل (الرفاعي والعمر، 2007).

جهاز الإحساس البصري مثل الرنين المصلي السطحي (Surface Plasmon Resonance (SPR) يعطي الكشف الفوري عن الممرضات المنقولة بالغذاء أو الجزيئات الحيوية، لان في هذا النظام يمكن ملاحظة ارتباط المستضد والضد خلال ثواني من اضافة العينة أما مستوى الارتباط الاعظمي يحدث خلال 15 دقيقة (Fatamico *et al.*, 1998; Rich & Myszka :2000 ; Sonezaki *et al.*, 2000 ; Koabova *et al.*, 2001).

طرق الكشف عن الليستيرية والتي تستخدم طريقة إكثار العينة و استخدام أوساط زرع انتقائية وتحديد النمط الظاهري للجرثومة استبدلت الآن بالنظم التشخيصية المناسبة والسريعة والمعتمدة على المظاهر الوراثية فيما يخص بالمسابر الحامضية النووية الصحيحة أو بالمستضدات الجرثومية المميزة المشاركة بالمرض مثل Listeriolysin O (LLO) phosphatidylinositol specific phospholipase C (PI-PLC) or the 60-kDa comprising p60 protein . وعلى أية حال فان الطرق المعتمدة في تحضير العينة على أساس الحمض النووي لاتزال مشكلة غير محلولة بينما الطرق المناعية تعتبر هي الأكثر دقة ومثانة بهذا المجال إلا أن التجارب المعتمدة في أساسها على الأجسام لمضادة (الاضداد) هي محدودة كثيراً بسبب قلة الاضداد الحساسة والنوعية ومن الممكن الاستفادة منها في كشف أنواع الليستيرية، ولكي يتم التغلب على هذه العقبة في التجارب المناعية لكشف الليستيرية تم الاستفادة من الاضداد المطورة حديثاً والتي أظهرت إفادة في كشف الليستيرية (الليستيرية وحيدة النواة) ضد المستضد p60 kD وهو بروتين خارج خلوي تنتجه كل أنواع الليستيرية ويعتبر مكون أساسي لتضاعف الخلية (Köhler *et al.*, 1990; Datta *et al.*, 1993; Makino *et al.*, 1995; Gholizadeh *et al.*, 1996; Bhunia, 1997; Bubert *et al.*; 1999.;).

إن الطرق والاختبارات السريعة والدقيقة المخصصة للكشف عن الليستيرية وحيدة النواة يجب أن تكون مطبقة وإلى حد كبير في مصانع المواد الغذائية وتحت إشراف أخصائيين، حيث إن طرق الكشف تتطلب عملية إغناء وعزل للجراثيم ثم إجراء الاختبارات الكيمياءحيوية للتعرف على نوع الليستيرية المتواجدة حيث يوجد في الأسواق حالياً كيتات تجارية مناسبة وسريعة في كشف أنواع الليستيرية (Swaminathan & Feng , 1994).

الليستيرية هي جراثيم صغيرة على هيئة عصيات مكورة ايجابية الغرام، ايجابية لاختبار الكاتالاز وسلبية لاختبار الأوكسيداز، متحركة، هوائية لاهوائية مخيرة، تنمو بدرجات حرارة ما بين 4- 45 م° و درجة حموضة ما بين pH (5.5- 9.6) أما نوع الليستيرية ايفانوفي *L. ivanovii* والليستيرية اينكوا *L. inouca* فهي من أقل الأنواع الممرضة للحيوانات، تتواجد وبشكل واسع في البيئة وفي النباتات أو الأعشاب وفي مياه المجاري المتحركة يوجد ست أنواع من جنس الليستيرية وتعتبر الليستيرية وحيدة النواة من أهم وأكثر الأنواع الممرضة وتصيب العديد من الحيوانات والإنسان (Murray et al., 1926).

تتواجد جراثيم الليستيرية في أماكن متعددة بالطبيعة وبشكل طبيعي في ملوثات المواد الغذائية ومنتجاتها مثل الحليب و اللحم والخضروات والمأكولات البحرية وتعتبر عامل مسبب لداء الليستيرية وهو مرض خطير ومميت للأشخاص المسنين وحديثي الولادة ومضطربي المناعة ، وبدراسات علم الأوبئة يعد داء الليستيرية من الأمراض المنقولة بالغذاء حيث سجلت حالات تفشي للمرض في أمريكا الشمالية وأوروبا وسجلت نسبة الوفيات تقريباً 20% ولكن قد تزداد نسبة خطورة المرض وتصل إلى نسبة 75% عند النساء الحوامل، ومعظم الوفيات كانت تعزى إلى الليستيرية وحيدة النواة والتي اعتبرت من المسببات الخطيرة على الصحة العامة بسبب قدرتها على النمو والتكاثر بدرجات حرارة منخفضة 4 م° ومقاومتها للإجهاد التناضحي وبقائها حية من إجراءات معالجات الحفظ (Rocourt & Berch, 1996; Cox et al., 1989; Bell & Kyriakides, 2005).

تتميز الأنواع الممرضة لجراثيم الليستيرية (الليستيرية وحيدة النواة، الليستيرية ايفانوفي) بقدرتها على خرق حواجز الخلايا الظهارية والبطانية للعائل المصاب متضمناً الأوعية

الدموية للدماغ والحاجز المشيمي للجنين، كما ولها القدرة على الغزو والتكاثر في الخلايا البالعة وغير البالعة حيث ترتبط جراثيم الليسترية بالخلايا حقيقة النواة بواسطة نوعين من البروتينات وهم InIB , InIA ، وهذه البروتينات تتواجد على سطح الجرثومة مع مستقبلات نوعية على أغشية الخلايا الهدف (Vazquez-; Cossort *et al.*, 2003)

.(Boland *et al.*, 2001)

2- أهداف الدراسة Objective:

الهدف من البحث:

نظراً لخطورة جراثيم الليستيرية وما تسببه من أمراض خطيرة للإنسان والحيوان ونظراً لكثرة مادة الحليب ومنتجاته من الأجبان في محافظة دير الزور لقد تم إجراء هذه الدراسة من أجل الوقوف على تقييم الليستيرية وإيجاد المضاد الجرثومي المناسب لها لحماية الإنسان أولاً ثم الحيوان والحد من خطورتها ومنع انتشارها وذلك من خلال:

- 1- عزل جراثيم الليستيرية من عينات من الحليب الأبقار والأغنام في محافظة دير الزور
- 2- عزل جراثيم الليستيرية من عينات من الأجبان الأبقار والأغنام في محافظة دير الزور
- 3- اختبار حساسية هذه العزولات اتجاه بعض المضادات الحيوية

أهمية البحث:

نظراً لقلّة الأبحاث حول هذه الجراثيم في القطر العربي السوري تم إجراء هذه الدراسة في محافظة دير الزور على عينات الحليب والأجبان الأبقار والأغنام ونظراً لأهمية الحليب والأجبان كغذاء أساسي للإنسان في القطر العربي السوري وفي محافظة دير الزور خاصة والتي تتركز فيها أعداد كبيرة من القطعان، ونظراً لانتشار الإصابة بداء الليستيرية في هذه القطعان بالإضافة إلى قلّة الدراسات عن داء الليستيرية في محافظة دير الزور.

الدراسة المرجعية

Literature Review

2- الدراسة المرجعية Literature Review:

2-1- داء الليستيرية Listeriosis:

داء الليستيرية مرض تسببه عصيات الليستيرية وحيدة النواة وهو من أقل وأهم الأمراض المنقولة بالغذاء، وما زال هذا المرض يسبب القلق للأطباء لما يسببه من نسبة وفيات عالية والتي قد تصل إلى 20% (Mead *et al.*, 1999).

تسبب عصيات الليستيرية أحماج عديدة للإنسان والحيوان محدثة نسبة وفيات عالية وخصوصاً في الأشخاص كبار السن والمرافقة لحالات مناعية مضطربة وضعيفة (Bennion *et al.*, 2001; Suarez *et al.*, 2008; Kruszyna *et al.*, 2008).

أكثر أحماج داء الليستيرية تكون مكتسبة عن طريق الغذاء وهذا ما أكدته منظمة الصحة بأنه يصيب الأشخاص المتقدمين بالسن وحدثي الولادة بسبب تناول الاغذية الملوثة مسبباً لأمراض متعددة مثل التهاب السحايا، تجرثم الدم، التهاب الأمعاء والقولون (Radice *et al.*, 2006; Mead *et al.*, 2006; Graham *et al.*, 2002; Winter *et al.*, 2009).

2-2- خطورة داء الليستيرية Listeriosis:

القلق الرئيسي من الإصابة بداء الليستيرية كون عصيات الليستيرية وحيدة النواة مقاومة وبشكل طبيعي للعديد من المضادات الحيوية المطبقة تجريبياً في علاج داء الليستيرية مثل الجيل الثالث والرابع للمضاد الحيوي سيفالوسبيرين. ولهذا تكون الإصابة بداء الليستيرية لكبار السن واتباع العلاج الخاطئ تنذر بسوء الإصابة حيث يكون التكهن السريري سيئ (Troxler *et al.*, 2000; Vicente *et al.*, 1990. Stepanovic *et al.*, 2004).

تتواجد جراثيم الليستيرية في كل مكان وتعتبر من ملوثات المنتجات الغذائية وهي تتضمن ست أنواع ولكن فقط الليستيرية وحيدة النواة هي الممرضة والمسببة لداء الليستيرية عند الإنسان والحيوانات، وقد تزايد هذا المرض في السنوات العشر الأخيرة نتيجة لتناول المواد الغذائية ومنتجاتها الملوثة وبالتالي اعتبر داء الليستيرية من أحد أهم الأمراض المنقولة بالغذاء (Farber & Peterkin, 1991).

عزلت جراثيم الليستيرية من أماكن متعددة منها التربة ومن الماء والنباتات ومن البراز واللحم والمأكولات البحرية والخضروات الفاسدة ومن الحليب الفاسد ومنتجاته كما عزلت من الإنسان والحيوانات الحاملة لجراثيم الليستيرية وبدون ظهور أعراض سريريهم عليهم (Jones, 1986).

حتمية الوجود المطلق لجراثيم الليستيرية وسهولة دخولها في بيئات تحضير الطعام وشركات تصنيع الأغذية ومقدرتها أيضاً على النمو والتكاثر بدرجة التبريد كلها عوامل تزيد من خطر تلوث الأغذية وبالتالي الإصابة بأخماج الليستيرية والمتمثلة بأعراض سريريهم تشير إلى التهاب السحايا، التهاب السحايا والدماع، التسمم الدموي إجهاض قبل ميعاد الولادة، الالتهاب المعوي المعدي إن السمة المميزة لأنواع الليستيرية الممرضة وهي قدرتها على خرق حواجز الخلايا الظهارية والطلائية للعائل المصاب متضمناً الدم والدماع والحاجز المشيمي للجنين، لأن الليستيرية وحيدة النواة والليستيرية ايفانوفي لهم القدرة على الغزو والتكاثر في الخلايا البالعة وغير البالعة (Vazquez- Boland *et al.*, 2001).

ويفسر وجود جراثيم *Listeria* في الحليب الخام المستخدم في تصنيع الأجبان البيضاء إلى وجود الجراثيم التابعة لجنس *Listeria* في عمليات تصنيع الجبن بالإضافة إلى عدم إتباع الطرائق الصحيحة للقضاء عليها خلال عمليات التصنيع (FSIS, 2000)، أو عن طريق تلوث المواد الأولية المستخدمة في عمليات التصنيع (OIE, 2000)، كما يحدث التلوث بعد عملية البسترة عند استخدام مواد التغليف (Hui *et al.*, 1994).

نسبة حدوث داء الليستيرية عادة ما تكون منخفضة وبمعدل 2- 15 حالة لكل مليون في السنة. إلا إن معدل الوفيات تكون عالية وقد تصل إلى ما بين 20- 30 % وخاصة في الأشخاص الذي يتطور داء الليستيرية لديهم مثل المرأة الحامل والإنسان المضطرب المناعة، وهذا مما يجعل من جرثومة الليستيرية وحيدة النواة شديدة الخطورة بالإنسان & Farber (Peterkin , 1991; Mead *et al.*, 1999).

وتم الإبلاغ عن حالات إصابة بداء الليستيرية عند الإنسان في جمهورية التشيك حيث تضاعف عدد الإصابات من 9 حالات في عام 1993 إلى 20 حالة وأكثر خلال الفترة الممتدة 2000 - 2002 (Epidat, 2003) بالمقارنة مع بقية الإصابات الأخرى وهذا المرض تحت المراقبة الدقيقة وذلك بسبب خطورة هذه الجراثيم ومعدلات الوفيات مرتفعة تصل إلى 30% وأكثر لدى الأشخاص المهنيين للمرض وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية (Cox, 1989).

الطريقة الأكثر شيوعاً لانتقال العدوى هي استهلاك الأطعمة الملوثة بجراثيم الليستيرية (Vasavada, 1988).

ومن الضروري أن أحد المتطلبات الصحية للمواد الخام والأغذية ذات الأصل الحيواني هي عدم وجود مسببات الأمراض للكائنات الحية الدقيقة ، بما في ذلك *L. monocytogenes* (CZ, 1999).

2-3- العامل المسبب:

الليستيرية هي جراثيم صغيرة على هيئة عصيات مكورة ايجابية لغرام، ايجابية لاختبار الكاتالاز وسلبية لاختبار الأوكسيداز، متحركة - هوائية لاهوائية مخيرة - تنمو بدرجات حرارة ما بين 4- 45 م° ودرجة حموضة ما بين pH (5.5 - 9.6) ويعتبر نوع الليستيرية ايفانوفي *L. ivanovii* والليستيرية اينكوا *L. inouca* من أقل الأنواع الممرضة للحيوانات، تتواجد وبشكل موسع في البيئة وفي النباتات أو الأعشاب وفي مياه المجاري المتحركة يوجد ست أنواع من جنس الليستيرية وتعتبر الليستيرية وحيدة النواة من أهم وأكثر الأنواع الممرضة وتصيب العديد من الحيوانات والإنسان (Murry et al., 1926).

الليستيرية تتضمن ست أنواع مختلفة هي:

1 - الليستيرية وحيدة النواة *L. monocytogenes*

2- الليستيرية ايفانوفي *L. ivanovii*

3- الليسترية سيلا جري L . seeligeri

4- الليسترية ولشيميري L.welshimeri

5- الليسترية اينكوا L. innocua

6 - اللسترية كري L. grayi

ولكن تعد فقط الليسترية وحيدة النواة، والليسترية ايفانوفي هما الممرضات للإنسان والحيوانات حيث تسبب الليسترية وحيدة النواة أخماج متعددة للإنسان والحيوانات في حين إن الليسترية ايفانوفي تكون مرفقة للأمراض التي تصيب الحيوانات). وان داء الليسترية عند الإنسان غالباً ما يكون من الأمراض المنقولة بالغذاء وبنسبة 99% نتيجة لتناول

المنتجات الغذائية الملوثة (Mead *et al.*, 1999).

الخواص الشكلية و التلويينية :

هي عصيات إيجابية الغرام غير متبوعة ولا تظهر محفظة وتنتظم وحيدة أو في ثنائيات أو على شكل سلاسل قصيرة، تنمو على البيئات الصلبة وبدرجة حرارة الغرفة تعطي عصيات خيطية متحركة وتزداد حركتها في البيئات السائلة بدرجة 25 مئوية، أما في المزارع الطازجة فتنتظم على شكل مكورات وتتوضع هذه العصيات داخل الخلية الحيوانية المصابة أو خارجها (الرفاعي والعمر، 2007).

الخواص المزرعية :

هي جراثيم هوائية لاهوائية مخريرة تنمو على البيئات العادية ويزاد نموها على المنابت الغنية مثل المنابت المضاف إليها خلاصة الكبد أو المصل أو الدم.

على الآغار الدموي: تنمو عصيات الليسترية خلال يوم أو يومين على شكل مستعمرات صغيرة قطر الواحدة (2) مم شفافة لامعة بيضاء تتحول رويداً رويداً إلى مستعمرات محاطة بمنطقة تحلل دموي كامل ضيقة.

على بيئة أغار التيلوريت بالتربتوس: تنمو معطية مستعمرات ناعمة لونها أسود وأطرافها خضراء (الرفاعي والعمر، 2007).

الخواص الكيميائية:

تعد هذه العصيات نشيطة بتفاعلاتها التخمرية فهي تخمر (سكر الجلوكوز، المالتوز واللاكتوز) دون إنطلاق غازات ولا تخمر المانيتول ولا تطلق الأندول ولا غاز H₂S، وتفكك الأسكولين بشكل سريع، ايجابية الكاتالاز وهي تفرز ذيفاناً محلاً للدم (الرفاعي والعمر، 2007).

4-2- الأعراض التي تسببها جراثيم الليسترية:

1- عند الإنسان:

الإصابة عند الحوامل وحديثي الولادة تشكل حوالي نصف مجموع الإصابات بالليستيرية وتحدث عادة بعد الأسبوع العشرين من الحمل، معظم الإصابات لا عرضية وسليمة الإنذار بالنسبة للأم، قد تحدث بعض التظاهرات الهضمية (إسهال مائي، حرارة، آلام بطنية) أو التنفسية (شكل النزلة الوافدة)، ونادراً ما تصاب بإنتان دم أو التهاب سحايا. وداء الليستيرية خلال مرحلة الحمل يمكن أن يكون عدوى داخل الرحم، ويتظاهر إما على شكل بدء باكراً early onset يؤدي إلى إنتان داخل الرحم وموت الحمل قبل أو بعد الولادة، أو على شكل بدء متأخر late onset يسبب التهاب سحايا بين الولادة والأسبوع الثالث من الحياة، أما الإصابة عند الكهول يمكن أن تتظاهر على شكل التهاب سحايا ودماع أو تجرثم دم خاصة عند مضعفي المناعة كخمج انتهازية (البنية وزملاؤه، 2016).

2- عند الحيوان:

تصيب هذه الجراثيم الجهاز العصبي المركزي وكذلك تحدث تسممات دموية في الحيوانات حديثة الولادة خاصة، إضافة إلى التهابات الرحم والاجهاض وعند الأغنام يحدث ما يسمى بمرض الدوران.

5-2- انتشار داء الليستيرية Listeriosis:

وفي دراسة أجريت في التشيك عن تلوث الأطعمة للكشف عن جراثيم الليستيرية عام 1998 حيث أن هذه الجراثيم الخطيرة تم العثور عليها في الأطعمة ذات أصل حيواني

(1998,Karpiskova)، حيث تعتبر منتجات الألبان (الجبن) الملوثة بجراثيم الليستيرية كمواد غذائية خطيرة (Marth & Ryser, 1990).

على الرغم من ذلك حيث يعتبر داء الليستيرية من الأمراض المنقولة بالغذاء إذ يمكن أن تنتقل هذه الجراثيم عن طريق استهلاك اللحوم الملوثة ومنتجاتها (Jay,1996).

ولقد ارتبطت معظم حالات الإصابة بمرض Listeriosis في العالم بتناول الحليب الخام حيث تم تسجيل مجموعة من الاصابات في ألمانيا عام 1981 (شحاته، 1981)، وفي العام نفسه ظهرت في كندا 85 إصابة أدت إلى الوفاة (Gava & others, 1996).

في عام 2002 تم التأكد من وجود عزولتين نقيتين من جراثيم *L. monocytogenes* من عينات الحليب التي تم اختبارها والتي بلغ عددها 111 عينة حليب بنسبة (1.8%) في الجمهورية التشيكية (Schlegelova *et al.*, 2002).

في حين أظهر الباحثين (Jensen *et al.*, 1996) نتيجة مماثلة خلال الفترة الممتدة بين 1972-1994 حيث تبين وجود جراثيم *L. monocytogenes* بنسبة 1.2% من قطعاً

وفي بداية التسعينيات بلغت نسبة تلوث الأجبان الناعمة بجراثيم الليستيرية 6% في السويد (Loncarvic *et al.*, 1995)، أما في نهاية التسعينيات أثبتت الدراسات بأن نسبة التلوث

في الأجبان المصنعة من حليب غير مبستر 4.8% في فرنسا (Rudol & Scherer, 2001).

في حين أظهرت دراسة أجراها (Marth & Ryser, 1990) للكشف عن جراثيم الليستيرية وحيدة النواة *L. monocytogenes* في الحليب المبستر ومنتجات الألبان.

كما بلغت نسبة تلوث الحليب البقري الخام بجراثيم تابعة لجنس *Listeria* في اسبانيا عام 1998 بنسبة 36% في حليب الأبقار ، و بنسبة 2.6% في حليب الماعز (Rodriguez *et al.*, 2001).

مشكلة أخرى هي حقيقة أن جراثيم الليستيرية تصبح مقاومة إلى واحد أو أكثر من الأدوية المضادة للميكروبات تحت ضغط استخدام مضادات الميكروبات (Teuber , 1999).

وفي عام 1985 تم الإبلاغ للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عن حالات الإصابة بمرض Listeriosis وذلك نتيجة تناول الجبن الطري المكسيكي (Ryser & Marth, 1991)، أما في سويسرا بلغت إجمالي حالات الإصابة عام 1987 المرتبطة بتناول الأجبان المنضجة بنسبة 50% (FDA , 2002)

وعلاوة على ذلك، تم إثبات انتقال المقاومة بين الأنواع البكتيرية الأخرى وهكذا الانتقال من *L. monocytogenes* إلى المكورات العنقودية المذهبة (Lemaitre *et al.*, 1998).

وقد تم اعتبار القشدة مع المنتجات اللبنية من المواد الغذائية التي تساعد على انتشار مرض Listeriosis وخاصة في ألمانيا نتيجة تناول الأجبان غير المطبوخة (CDC, 2002).

وفي تقرير ذكره مجموعة من الأطباء والطب الوقائي في أحد مستشفيات ريو دي جينرو (البرازيل) ان معظم مرضى داء الليستيرية هم من المسنون والذين يعانون من نقص واضطراب المناعة، وإن بعض المرضى تطورت الإصابة لديهم إلى مجرى الدم وكانت العترة المسببة للإصابة من النمط المصلي 1/2b، ومرضى آخرون كان عندهم التهاب البريتون والنمط المصلي المسبب 3b و 1/2b كما أشاروا إلى أن مطبخ المشفى هو مصدر محتمل للعدوى (Martins *et al.*, 2010).

كما ظهرت إصابات في بريطانيا عام 1988 وذلك بسبب استخدام الأجبان المصنعة من حليب الماعز غير معاملة حرارياً، وتم الربط مع 60% من حالات الإصابة المنتشرة في فرنسا عام 1992 نتيجة تناول الأجبان الطرية الناعمة مما أدى إلى منع النساء الحوامل من التغذية على الأجبان الناعمة في أوروبا (شحاتة، 1997).

ذكر مجموعة من الباحثين بأنه قد حدث تفشي ل 40 حالة نتيجة لتناول النفاث المقلية وسببت حدوث أربع وفيات. وفي عام 2001 سجل نفس الباحث 101 حالة لداء الليستيرية. أنفاً كما أشار الباحث نفسه عام 2002 تفشي لداء الليستيرية في كارولينا الشمالية نتيجة لتناول جبنه طرية محضرة بالطريقة المكسيكية من حليب خام ملوث أدى إلى حدوث خمس

ولادات لأجنة ميتة (ثلاثة منهم كانوا غير ناضجي التكوين، واثنان كانا مصابين بالمرض)، كون النمط المصلي المرتبط بهذه الإصابات المذكورة لداء الليستيرية هو 4b (CDC, 1998).

كما تم عزل جراثيم الليستيرية في الولايات المتحدة الأمريكية من المثلجات اللبنية والتي أدت إلى ظهور حالات عديدة من الأجنة الميتة نتيجة إصابتها بجراثيم الليستيرية وحيدة النواة *L. monocytogenes* وذلك بسبب تناول الأمهات للمثلجات اللبنية خلال فترة الحمل، كما أثبتت دراسات عديدة في العالم منها عام 2000 والتي أثبتت عن وجود إصابات عديدة ناتجة عن تناول المثلجات اللبنية في مناطق مختلفة من أوروبا وأمريكا اللاتينية (Windrantz & Arias, 2000) ولكن جميع هذه الدراسات لم تتجح في إثبات المثلجات اللبنية مصدراً للتلوث (Ryser & Marth, 1991).

ولقد أثبتت الدراسات بأن جراثيم الليستيرية وحيدة النواة جراثيم ممرضة للإنسان وتعتبر من أهم الممرضات المنقولة بالغذاء. ولكن لم يذكر بأن الإنسان أصيب بداء الليستيرية (الليستيرية وحيدة النواة) نتيجة تناول البيض أو منتجاته على الرغم من عزلها من براز وقناة البيض للدجاج ولكن بدون ان تظهر عليها أعراض المرض. ولكي يثبتوا وجود الليستيرية وحيدة النواة في البيض ومنتجاته. جمعت 144 عينة ومن 30 مركز لتخزين البيض حيث وجود 25 عزولة لليستيريا وحيدة النواة في البيض المأخوذ عشوائياً والمخزن على الدرجة 2 م° لمدة يومين و 4 عزولات من البيض المعقم والمخزن على الدرجة 2 م° لمدة يومين وكانت أكثر العزولات في الصيف والشتاء عنها في الخريف (Rivoal et al., 2010).

وأجريت مجموعة من الدراسات للتأكد من وجود جراثيم الليستيرية في منتجات الألبان في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة الممتدة 1993-1997 (Baek et al., 2000) حيث بلغت نسبة تلوث الحليب الخام 4,5% ولم تلاحظ في الحليب المبستر، أما في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة 1998-2000 بلغت نسبة تلوث الحليب الخام الملوث بأحد الأنواع التابعة لجنس الليستيرية بنسبة 21.6% (Hassan et al., 2000).

2-6- وبائية داء الليستيرية Liserosis:

جراثيم الليستيرية جراثيم واسعة الانتشار في الطبيعة ظهرت خلال العقد الماضي كأحد الأمراض الهامة المحمولة بالغذاء، وتعتبر المنتجات الغذائية مثل منتجات الألبان واللحم والخضروات لها الدور الأكبر في انتشار وتفشي داء الليستيرية ولهذا كانت الحاجة توجب اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة من أجل السيطرة على الغذاء الملوث بجراثيم الليستيرية وحيدة النواة (Hiroshi) ; Van Renterghem *et al.*, 1991 ; Riedo *et al.*, 1994; Rocourt & Cossart, 1997).
(*et al.*, 1996; Rocourt & Cossart, 1997).

2-7- مصدر ومخزن الخمج بالنسبة للإنسان:

1- ينتشر العامل المسبب بشكل واسع في الحيوانات والإنسان والبيئة، فقد عزلت هذه الجراثيم من مختلف أنواع الحيوانات والطيور والتربة والنباتات والمراعي والمياه ومجاري المياه. حيث إن الأبقار والأغنام وكثير من أنواع الحيوانات المصابة تنتشر العامل المسبب عن طريق برازها، كما عزل من أعداد كبيرة من الأصحاء، كما عزل من النساء الحوامل بنسبة (20-30%) كما أنه يوجد في القناة التناسلية للنساء، وبذلك فإن الأم المصابة تعتبر مصدراً لخمج الجنين والطفل الوليد.

2- يعتبر الحليب الملوث ببراز الأبقار المصابة مصدراً للعدوى، إضافة إلى الخضروات التي تتلوث بهذا البراز، كما تعتبر لحوم الحيوانات الملوثة مصدراً للخمج.

3- تعتبر الحيوانات بكافة أنواعها والإنسان المصاب أو الحامل للمرض والبيئة (التربة) والنباتات والخضروات والأتربة مخزناً للخمج.

2-8- طرق انتقال المرض إلى الإنسان :

1 - عن طريق استنشاق الأتربة الملوثة.

2- عن طريق استهلاك لحوم الحيوانات والطيور الملوثة إما نيئة أو غير مطبوخة بشكل جيد واستهلاك الخضروات الملوثة التي تستهلك نيئة.

3- وعلى الأغلب تتلوث القناة التناسلية للأم عن طريق برازها، بينما يصاب الجنين عن طريق الدم والمشيمة.

4- قد ينتقل المرض بين المرأة وزوجها عن طريق الجماع، فقد تم عزل الجراثيم من السائل المنوي لرجل كانت إمراته مصابة بالليستيرية في القناة التناسلية مما يوحي بالاعتقاد بأن المرض قد ينتقل عن طريق الجنس.

5- قد يحصل المرض بين المواليد الحديثة في قسم الأطفال في المستشفيات أو في غرف المواليد الحديثة.

6- قد تلعب بعض العوامل في ظهور المرض عند الإنسان مثل الإجهاض أو الترافق مع مرض آخر أو المعالجة التي تؤدي إلى تخفيض المناعة، ومن العوامل المهيئة الأخرى الهبوط في الجهاز المناعي الذي قد يحصل لدى كبار السن وأيضاً التغيرات في الغدد الصماء خلال الحمل، والنقص في النظام المناعي عند المستوى المشيمي .

2-9- الأمراض:

تدخل هذه الجراثيم الجسم عن طريق الجهاز الهضمي عند تناول طعام ملوث بها كالأجبان، اللحوم والنباتات. تملك الليستيرية بروتين سطحي في جدارها الخلوي يدعى انترنالين Internalin يتفاعل مع مستقبل على الخلايا الظهارية هو E-cadherin محرضاً عملية البلعمة إلى داخل الخلايا الظهارية. بعد عملية البلعمة يصبح الجرثوم محاطاً داخل اليبلوع Phagosome حيث يحرض ال PH المنخفضة الجرثوم على إنتاج الليستيروليزين O Listeiolysin وهو الأنزيم الذي يحل غشاء اليبلوع مما يسمح للجرثوم بالهرب إلى هيولى الخلايا الظهارية، حيث يتكاثر الجرثوم ويولد بلمرة الأكتين الذي يدفع الخلايا الجرثومية إلى الغشاء الخلوي محدثاً نتوءات فيه تدعى أرجل كاذبة خيطية Filopods.

هذه الأرجل الكاذبة تبتلعها الخلايا الظهارية المجاورة والبلاعم والخلايا الكبدية ثم تتحرر الليستيرية وتبدأ دورة ثانية من جديد. بذلك تنتقل الليستيرية من خلية لأخرى دون أن تتعرض للأضداد والمتممة وكثيرات النوى. المناعة ضد الليستيرية هي مناعة خلوية بالدرجة الأولى حيث إن الإنتان داخل خلوي ويترافق بشكل ملحوظ مع حالات نقص المناعة الخلوية والإيدز AIDS واللمفوما ونقل الأعضاء (البنى وزملاؤه، 2016).

المواد وطرائق العمل

Material and Methods

3- مواد وطرائق البحث:

3-1- مواد البحث:

3-1-1- العينات:

تم جمع 120 عينة (60 عينة من الحليب و60 عينة من الألبان) من محافظة دير الزور مصدرها الأبقار والأغنام من نيسان وحتى أيلول 2021.

الجدول رقم (1): عدد ونوع العينات المدروسة

المجموع	ألبان		حليب		العينات
	أغنام	أبقار	أغنام	أبقار	عدد العينات
	30	30	30	30	
120	60		60		العدد الكلي

3-1-2- المواد المستخدمة في الزرع والعزل الجرثومي والاختبارات

البيوكيميائية:

1- الأوساط المزرعية المستخدمة لعزل جراثيم الليسترية:

منبت بالاكام – منبت اوكسفورد من انتاج شركة Hi Media حيث تعد هذه الأوساط خاصة لنمو جراثيم الليسترية. تم تحضير هذه الأوساط وذلك حسب تعليمات الشركة المصنعة وبعد وتعقيمها في الموصدة و إضافة المعزز الخاص لكل وسط بعد تبريده للدرجة 50 م ، ومن ثم صب الأوساط في أطباق بتري معقمة وحفظت بالبراد لحين الاستخدام.

2- الأوساط والمواد المستخدمة في اختبار التحلل الدموي:

الأجار الدموي من انتاج شركة Hi Media – دم أغنام منزوع الفيبرين 5%. وتم تحضيره حسب تعليمات الشركة المصنعة، وتم إضافة 5% دم أغنام منزوع الفيبرين وذلك بعد التعقيم والتبريد لدرجة حرارة 50 م، وبعدها تم صب الوسط الناتج في أطباق بتري معقمة، واستخدم هذا الوسط من أجل الكشف عن مقدرة الجرثوم على تحليل كريات الدم الحمراء.

3- الأوساط والمواد المستخدمة في الاختبارات البيوكيميائية:

- مرق منقوع القلب والدماغ من أجل اختبار الحركة من انتاج شركة Hi Media تم استخدام هذا الوسط من أجل اختبار حركة الجرثوم.
- السكاكر المستخدمة (لاكتوز - الجلوكوز - المالتوز)
- ماء ببتون - ماء أوكسجينى - بارافين- ماء مقطر
- كاشف أوكسداز - بيروكسيد الهيدروجين
- كاشف أندريد، كاشف كوفالك، كاشف أحمر الميثيل، كاشف باريت

4- الأوساط والمواد المستخدمة في اختبار الحساسية:

- مرق مغذي - وسط مولر هينتون - أقراص مضادات حيوية من أجل اختبار الحساسية من انتاج شركة Hi Media.

5- الأجهزة اللازمة للبحث:

- حضانة كهربائية - براد ومجمدة - محم مائي - اوتوكلاف - مثقلة - رجاج - مجهر ضوئي
- أنابيب بلاستيكية سعة 10 مل ذات غطاء معقمة لجمع عينات الحليب والأجبان - كحول
- قطن - حافظه ثلجية - قطع ثلج.

3-2- طرائق البحث:

3-2-1- طريقة جمع العينات وتحضيرها للزرع الجرثومي:

- تم جمع 120 من العينات مل (5-10) 60 عينة من الحليب (30عينة حليب أبقار + 30 عينة حليب أغنام) و60 عينة من الأجبان (30عينة جبن أبقار + 30 عينة جبن أغنام) خلال الفترة 2021\4\1-2021\10\1 .

تم جمع العينات بشكل عشوائي من أماكن مختلفة خاصة لبيع الحليب ومنتجاته في محافظة دير الزور حيث تم أخذ 10 مل من خزان الحليب بعد مجانسته ووضعت في أنابيب بلاستيكية معقمة مغلقة سعة (20) مل و أخذ قطعة من الجبن بوزن 200 غ ووضعت في عبوة معقمة من أجل الكشف عن جراثيم الليستيرية ، إذ نقلت العينات تحت ظروف التبريد إلى مخبر الأحياء الدقيقة في كلية الطب البيطري بجامعة حماة لإجراء التجارب المخبرية عليها.

أولاً: تحضير العينات قبل البدء بالزرع الجرثومي:

تم إكثار العينات على البارد وذلك بوضع العينات في البراد ولمدة 24-48 ساعة من أجل تثبيط الجراثيم المرافقة وبقاء جراثيم الليستيرية كونها جراثيم محبة للبرودة على عكس الجراثيم الأخرى.

ثانياً: الزرع الجرثومي لعينات الحليب لعزل جراثيم الليستيرية:

1- تم زراعة كل العينات كل واحدة على حدة على وسط بالاكام بعد إضافة المعزز الخاص وحضنت على الدرجة 32 م° لمدة 24-48 ساعة، كل المستعمرات سوداء اللون على أطباق البتري لوسط بالاكام تم نقلها بغرض العزل.

2- نقلت المستعمرات التي نمت على وسط بالاكام إلى وسط أكسفورد بعد إضافة المعزز الخاص له وحضنت على الدرجة 32 م° ولمدة 24-48 ساعة.

ثالثاً : تنقية جراثيم الليستيرية:

تم اختبار مستعمرات نموذجية معزولة ومفردة والتي نمت على وسط أكسفورد ونقلت أيضاً إلى وسط أكسفورد مرة أخرى وذلك من أجل تنقية جراثيم الليستيرية. بالنسبة لعينات الأجبان زرعت في المرق المغذي بعد استحلابها بطريقة الستوماخ ومن ثم تم اتباع الخطوات السابقة بالزرع على منبت بالاكام ووسط أكسفورد والتي تم شرحها سابقاً في زراعة عينات الحليب بغرض عزل وتنقية هذه المستعمرات.

ومن المستعمرات النموذجية والخاصة بمواصفات مستعمرات الليستيرية أجريت عليها الاختبارات الكيمياءحيوية واختبار الحركة.

دراسة الخواص الشكلية:

تم دراسة الخواص الشكلية والتلوينية للجراثيم النامية وذلك بتحضير لطاخة جرثومية من المستعمرات النامية على منبت أكسفورد وتم صبغها بطريقة غرام حيث تظهر جراثيم الليستيرية على شكل عصيات مكورة بنفسجية اللون.

- اختبار التحلل الدموي Hemolysin Test:

تم أخذ مستعمرة نموذجية من الأوساط المزرعية الاختيارية وزرعت على وسط الأغار الدموي المحضر مسبقاً وتم التحضين على الدرجة 37 م لمدة 24-48 ساعة وتم دراسة خواص النمو وشكل المستعمرات حيث تكون جراثيم الليستيرية محلله للدم تحلل كامل

- اختبار الحركة Motility TEST:

تم أخذ مستعمرات قياسية من سطح الأوساط المزرعية الانتقائية ثم زراعتها على وسط مرق نقيع القلب والدماغ وتم تحضينها على الدرجة (22-25) م لمدة (2-4) ساعات ثم نقل قطرة إلى الشريحة زجاجية خاصة تحتوي في وسطها على تقعر (اختبار القطرة المعلقة) وبعدها تفحص الحركة بملاحظة الحركة المتقلبة لليستيرية المستوحدة.

- اختبار الكاتالاز Catalase Test:

تم إضافة قطرات من محلول بيروكسيد الهيدروجين على شريحة زجاجية تحتوي على مستعمرات طازجة مأخوذة من منبت أوكسفورد أخذت بواسطة لوب الزرع وظهور فقاعات غازية هذا يدل على نتيجة موجبة للكاتالاز.

- اختبار أوكسيداز Oxidase Test :

تم وضع قطرة (2-3) من محلول كاشف الأوكسيداز على ورقة ترشيح معقمة موضوعة داخل طبق بتري معقم ثم أخذ مستعمرات من النمو الجرثومي بواسطة قضيب زجاجي ومررت على ورقة الترشيح المبللة بالكاشف وظهور اللون الأرجواني الغامق خلال (5-10) ثانية تكون نتيجة ايجابية للأوكسيداز.

- طريقة تحضير وسط كلارك- لويس لإجراء الاختبارات (MR ، VP):

نحضر (7 غ) بيتون، (5 غ) غلوكوز، (5 غ) ثنائي فوسفات البوتاسيوم، ليتر ماء مقطر. تحل هذه الكميات في الماء المقطر ثم تعبأ في أنابيب (4 مل / أنبوب) ثم تعقم بالموصدة مدة 15 دقيقة على الدرجة 121 م وضغط 1.5 بار.

- اختبار أحمر الميثيل Methyl Red Test:

نأخذ بواسطة لوب الزرع مستعمرات من وسط أوكسفورد وتزرع في 5 مل من وسط كلارك - لويس على الدرجة 30 م لمدة 24-48 ساعة، وبعدها تضاف عدة قطرات من مشعر أحمر الميثيل في الحالة الإيجابية تلون البيئة باللون الأحمر وهذا يعد دليلاً على أن الوسط أصبح حمضياً نتيجة لتفكك وتخمر الغلوكوز، اما في الحالة السلبية: بقاء الوسط قلوياً وبلون أصفر.

- اختبار فوكس بروسكاور Voges-proskauer TEST:

حيث يتم استخدام وسط كلارك- لويس، حيث يزرع الجرثوم في 2-3 مل من هذا الوسط على الدرجة 37 م لمدة 48 ساعة ثم يضاف له مشعر باريت والذي يتألف من:

1- محلول ألفا نفتول (6%) في الكحول الإيثيلي المطلق.

2- محلول ماءات البوتاسيوم بتركيز (40%) .

ثم يضاف إلى كل 3 مل من البيئة 1 مل من المحلول الأول، و4 مل من المحلول الثاني ثم يحرك الأنبوب الحاوي على البيئة جيداً، ويترك لمدة 20 دقيقة في درجة حرارة الغرفة في الحالة الإيجابية تلون الوسط باللون الأحمر الأيوزيني والذي يظهر بعد مرور ما يقارب 5-10 دقائق.

- اختبار كامب CAMP Test:

يعد هذا الاختبار من الاختبارات التأكيدية التي تكشف عن وجود جراثيم الليستيرية وهو يعتمد على إظهار خاصية التحلل الدموي ونوع هذا التحلل.

طريقة العمل: يؤخذ طبق آجار مدمى بدم الأغنام وتزرع على امتداد قطر الطبق (في منتصف الطبق) مستعمرات من المكورات العنقودية الذهبية المحللة للدم تحليلاً غير كامل، تزرع جراثيم المراد اختبارها من أعلى وأسفل خط نمو جراثيم العنقودية الذهبية، تحضن بدرجة 37 م لمدة 24 ساعة
ففي الحالة الإيجابية ظهور خط نمو جراثيم الليستيرية من أعلى وأسفل خط نمو جراثيم العنقودية الذهبية.

- اختبار الأندول Indol Test:

تم زرع الجرثوم في مرق ماء الببتون عند الدرجة 37 م° لمدة 24-48 ساعة وبعدها أضيف 0.5 مل من كاشف كوفاك ففي النتيجة السلبية لم تتشكل حلقة حمراء ظهور حلقة صفراء بلون الكاشف على السطح.

- اختبار تخمر السكريات: Carbohydrate Fermentation Test

طريقة تحضير وسط تخمر السكريات:

يتكون وسط تخمر السكريات من ببتون 10 غ نكاشف أندريد 2،0% مل، ماء مقطر 1000 مل ويعقم الوسط في الأتوكلاف في درجة حرارة 121 م° لمدة 15 دقيقة.

طريقة تحضير محلول السكريات 10%:

يتكون وسط محلول السكريات تركيز 10% من السكريات 10 غ، ماء مقطر 90 مل وبعد تمام الذوبان تعقم بالفلتره والسكريات المستخدمة في التفاعل (اللاكتوز- الجلوكوز- المالتوز)

ويضاف محلول السكريات 10% بحجم مل = 1000 ميكروليتر بوسط تخمر السكريات بحجم (9مل) بحيث يصبح تركيز الوسط النهائي (1%) ويتم توزيع المزيج في أنابيب معقمة بحيث يحتوي كل أنبوب 2،5 مل.

طريقة العمل:

يزرع من المنابت الجرثومية حتى أعرق نقطة في الانبوب الحاوي على وسط تخمر السكريات (1%)، ثم تحضن الأنابيب على الدرجة 32 م° لمدة 24- ساعة حيث تكون النتيجة ايجابية إذا تغير لون الأنبوب بحيث يصبح بلون زهري أو زهري خفيف وتكون النتيجة سلبية إذا لم يتغير لون الوسط.

وجراثيم الليسترية ايجابية للساكر (اللاكتوز- الجلوكوز- المالتوز).

- اختبار حساسية العزولات للمضادات الحيوية:

اجري اختبار الحساسية للعزولات التي تم الحصول عليها اتجاه 7 أنواع من المضادات الحيوية وهي: لينكومايسين، أموكسولين، سولفاسوميدين، ستربتومايسين، كلوكساسلين،

سبيكينومايسين، كولستين على وسط آغار مولر هينتون وتم اختيار هذه المضادات الحيوية من بين المضادات الأكثر استخداماً والمتوفرة تجارياً.

تم إجراء الاختبار بزرع 1-3 مستعمرة جرثومية حديثة النمو في محلول ملحي معقم ومزجها حتى التجانس بغية الحصول على معلق جرثومي متجانس ذو عكازه توافق 0.5 على مقياس ماك-فرلاند Mcfarland. تم زرع 100 µL من المعلق الجرثومي على سطح وسط آغار مولر هينتون بطريقة الإكثار باستخدام ماسحة قطنية، ترك الطبق المزروع لمدة 10 دقائق ليُجف ثم وزعت أقراص المضادات الحيوية على سطح الطبق باستخدام ملقط معقم وبجانب اللهب، حضنت الأطباق على الدرجة 37 م° ولمدة 24 ساعة، تم قراءة النتيجة من خلال قياس قطر مناطق منع النمو للجراثيم حول أقراص المضادات الحيوية ومقارنتها بالجدول القياسية حسب توصيات الشركة المصنعة. قسمت نتيجة تحسس العزولات للمضادات الحيوية الى ثلاث فئات وهي:

إما حساسة (S) Sensitive

أو متوسط الحساسية (I) Intermediate

أو مقاومة (R) Resistance.

النتائج

Results

4- النتائج:

أظهرت نتائج الزرع والعزل الجرثومي للعينات المدروسة ومن خلال دراسة الخواص الشكلية والتلوينية وبعد إجراء الاختبارات الكيمياءحيوية عن التوصل إلى تحديد هوية 10 عزولات من جراثيم الليستيرية (4) عزولات من الحليب (3) عزولات من جراثيم الليستيرية من حليب الأبقار و عزولة واحدة من حليب الأغنام) وبنسبة 10% ، 3.33 % على التوالي كما في الجدول رقم (2).

أما بالنسبة للأجبان فقد تم التوصل إلى تحديد هوية 6 عزولات من جراثيم الليستيرية (4) عزولات من جبن الأغنام، 2 عزولة من جبن الأبقار) وبنسبة 13.33% ، 6.66% على التوالي كما في الجداول (2).

الجدول رقم (2): نسبة عزل الليستيرية من عينات الحليب والأجبان.

أجبان		حليب		العينات
أغنام	أبقار	أغنام	أبقار	
4	2	1	3	عدد العينات الإيجابية
26	28	29	27	عدد العينات السلبية
30	30	30	30	العدد الكلي
13.33%	6.66%	3.33%	10 %	نسبة العزل

- تحديد هوية عزولات الليستيرية:

أظهرت كل العزولات نفس شكل المستعمرات المميزة لجراثيم الليستيرية على منبت بالاكام وأوكسفورد وعند دراسة خواصها الشكلية والتلوينية كانت على شكل عصيات مكورات بنفسجية اللون ايجابية الغرام كما هو مبين في الصور (1-4).

الصورة رقم (2): نمو جراثيم الليسترية على منبت أوكسفورد

الصورة رقم (1): نمو جراثيم الليسترية على منبت بالاكام

الصورة رقم (4): تخمير السكاكر لجراثيم الليسترية

الصورة رقم (3): جراثيم الليسترية بعد عملية التنقية على منبت أوكسفورد

وقد كانت كافة العزولات إيجابية للكاتلاز وسلبية للأوكسيداز ومحللة للدم ومتحركة ونشطة على الدرجة 25-28م. وهذا موضح في الجداول (3، 4، 5، 6 و 7) والمخططات (1، 2، 3 و 4)

الجدول رقم (3): نتائج عزل جراثيم الليستيرية في حليب الأبقار حسب أشهر الدراسة.

أشهر الدراسة	عدد العينات	العينات الإيجابية	العينات السالبة	نسبة التلوث %
نيسان 2021	5	1	4	20 ^a
أيار 2021	5	0	5	0 ^b
حزيران 2021	5	0	5	0 ^b
تموز 2021	5	1	4	20 ^a
أب 2021	5	0	5	0 ^b
أيلول 2021	5	1	4	20 ^a
المجموع	30	3	27	10

تدل الأحرف a ، b ، c على وجود فروقات معنوية في حال اختلافها ضمن نفس العمود وذلك عند المقارنة بين نسب التلوث المئوية باستخدام اختبار كاي مربع Chi Square Test في البرنامج الإحصائي SPSS 20 حيث اعتبرت الفروقات معنوية عند $P < 0.05$.

المخطط رقم (1): نتائج عزل جراثيم الليستيرية في حليب الأبقار حسب أشهر الدراسة.

الجدول رقم (4): نتائج عزل جراثيم الليستيرية في حليب الأغنام حسب أشهر الدراسة.

أشهر الدراسة	عدد العينات	العينات الإيجابية	العينات السالبة	نسبة التلوث %
نيسان 2021	5	1	4	20 ^a
أيار 2021	5	0	5	0 ^b
حزيران 2021	5	0	5	0 ^b
تموز 2021	5	0	5	0 ^b
أب 2021	5	0	5	0 ^b
أيلول 2021	5	0	5	0 ^b
المجموع	30	1	29	3.33

تدل الأحرف a ، b ، c على وجود فروقات معنوية في حال اختلافها ضمن نفس العمود وذلك عند المقارنة بين نسب التلوث المئوية باستخدام اختبار كاي مربع Chi Square Test في البرنامج الإحصائي SPSS 20 حيث اعتبرت الفروقات معنوية عند $P < 0.05$

المخطط رقم (2): نتائج عزل جراثيم الليستيرية في حليب الأغنام حسب أشهر الدراسة.

الجدول رقم (5): نتائج عزل جراثيم الليستيرية في أجبان الأغنام حسب أشهر الدراسة.

أشهر الدراسة	عدد العينات	العينات الإيجابية	العينات السالبة	نسبة التلوث %
نيسان 2021	5	1	4	20 ^a
أيار 2021	5	2	3	40 ^b
حزيران 2021	5	0	5	0 ^c
تموز 2021	5	1	4	20 ^a
أب 2021	5	0	5	0 ^c
أيلول 2021	5	0	5	0 ^c
المجموع	30	4	26	13.33

تدل الأحرف a ، b ، c على وجود فروقات معنوية في حال اختلافها ضمن نفس العمود وذلك عند المقارنة بين نسب التلوث المئوية باستخدام اختبار كاي مربع Chi Square Test في البرنامج الإحصائي SPSS 20 حيث اعتبرت الفروقات معنوية عند $P < 0.05$

المخطط رقم (3): نتائج عزل جراثيم الليستيرية في أجبان الأغنام حسب أشهر الدراسة.

الجدول رقم (6): نتائج عزل جراثيم الليستيرية في أجبان الأبقار حسب أشهر الدراسة.

أشهر الدراسة	عدد العينات	العينات الإيجابية	العينات السالبة	نسبة التلوث%
نيسان 2021	5	0	5	0 ^a
أيار 2021	5	1	4	20 ^b
حزيران 2021	5	0	5	0 ^a
تموز 2021	5	1	4	20 ^b
أب 2021	5	0	5	0 ^a
أيلول 2021	5	0	5	0 ^a
المجموع	30	2	28	6.66

تدل الأحرف a ، b ، c على وجود فروقات معنوية في حال اختلافها ضمن نفس العمود وذلك عند المقارنة بين نسب التلوث المئوية باستخدام اختبار كاي مربع Chi Square Test في البرنامج الإحصائي SPSS 20 حيث اعتبرت الفروقات معنوية عند $P < 0.05$.

المخطط رقم (4) : نتائج عزل جراثيم الليستيرية في أجبان الأبقار حسب أشهر الدراسة.

الجدول رقم (7): نتائج الاختبارات البيوكيميائية المطبقة على عزولات جراثيم الليستيرية.

العزولات	عدد العزولات	الحركة	تحلل الدم	كاتلاز	أوكسيداز	تخمير السكاكر			MR	VP	كامب	الأندول
						م	غ	لا				
عزولات حليب الأبقار	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
	1	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-
	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-
عزولات حليب الأغنام	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
عزولات جبن الأبقار	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-
	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-
عزولات جبن الأغنام	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-
	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
	1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-

حيث: م: مالتوز، غ: غلوكوز، لا: لاكتوز

MR : أحمر الميثيل ، VP: فوكس بروسكاور

نتيجة اختبار الحساسية للمضادات الحيوية:

لقد أعطت جميع العزولات (10 عزولات) التي تم تحديد هويتها حساسية متوسطة للمضاد الحيوي (البنسلين) وبنسبة 50 %، في حين أظهرت نتائج هذه الدراسة أن كل عزولات جراثيم الليستيرية التي تم الكشف عنها كانت مقاومة بنسبة 100% للمضادات الحيوية التي تم استخدامها في هذه الدراسة (لينكوميسين، أموكسلين، سولفاسوميدين، ستربتومايسين، كلوكساسلين، سبيكينومايسين، كولستين) كما هو موضح في الجدول (8).

الجدول رقم (8): نتائج اختبار الحساسية للمضادات الحيوية على عزولات جراثيم الليستيرية.

المقاومة	الحساسية	المضادات الحيوية
100%	-	لينكوميسين
-	50%	بنسلين
100%	-	أموكسلين
100%	-	سولفاسوميدين
100%	-	ستربتومايسين
100%	-	كلوكساسلين
100%	-	سبيكينومايسين
100%	-	كولستين

المناقشة

DISCUSSION

5- المناقشة:

إن الغاية من هذه الدراسة هو عزل وتحديد هوية جراثيم الليستيرية من الحليب والأجبان في محافظة دير الزور، حيث تعد جراثيم الليستيرية من الجراثيم الخطيرة لما تسببه من أمراض خطيرة للإنسان والحيوان .

لقد تم استخدام Oxford Listeria Selective Agar لاحتواء هذا الوسط على مواد تثبط نمو الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة غرام الأخرى لاحتواء على Lithiumchloride التي تكبح نمو العديد من الجراثيم الموجبة الأخرى وكذلك لاحتواء على Criflavine الذي يثبط نمو الجراثيم الموجبة و Cefotetan و Fosfomycin الذي يثبط نمو المكورات العقدية والعنقودية والعائلة المعوية.

وقد تم الحصول على (10) عزولات من جراثيم الليستيرية حيث ظهرت المستعمرات سوداء اللون وعند القيام بإجراء صباغة العزولات الجرثومية باستخدام صبغة غرام Gram Stain وفحصها بالمجهر الضوئي على العدسة الزيتية حيث ظهرت الجراثيم موجبة لصبغة غرام على شكل عصيات صغيرة وكبيرة تشبه الأحرف الصينية مع أشكال كروية وعصوية كروية وتترتب بشكل ميز بهيئة الأحرف Y, V وذلك بسبب وجود البروتين السطحي Act-A حيث يعمل على الالتصاق بالخلية الثانية من جهة القطب المحتوي على البروتين Act-A بسبب التجاذب المغناطيسي أو قد يعود إلى اختلاف الشحنات الكهربائية في الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية والتي تكون متعاكسة في ترتيب شحناتها السطحية وبالتالي تنجذب النهايات إلى بعضها البعض.

أما بالنسبة إلى نتائج الزرع على وسط الأجار الدموي حيث تبين أنها محللة للدم ولها القدرة على إنتاج مناطق تحلل دموي من نوع β وذلك ناتج عن تأثير عامل تحلل الدم الموجود في جراثيم الليستيرية Listerolysin O، وأظهرت جميع عزولات جراثيم الليستيرية نتيجة موجبة لاختبار الكاتلاز وسلبية لاختبار الأوكسيداز.

وكانت نسبة عزل جراثيم الليستيرية في بحثنا هذا من حليب الأبقار كما هو موضح في الجدول (2) والتي بلغت (10%) تعد هذه النسبة أكثر مما توصلوا إليه (1996, Jensen) الذي سجل بنسبة (1.2%).

أما بالنسبة لنتيجة عزل جراثيم الليستيرية في حليب الأغنام في هذه الدراسة بلغت بنسبة (3.33%) وهذه النتيجة أقل من النتائج التي توصلوا إليها (Muraoka *et al.*, 2003) حيث سجلوا بنسبة (4.9%) في حليب الأغنام بينما كانت نتيجة بحثنا متقاربة إلى ما توصلوا إليه (Gaya *et al.*, 1998) والتي بلغت (3.62%).

وبالنسبة لنتيجة عزل جراثيم الليستيرية في الأجبان تم الحصول على 6 عزولات من الأجبان (4 عزولات من الجبن الأغنام، 2 عزولة من الجبن الأبقار) وبنسبة 13.33%، 6.66% على التوالي وهي أكثر مما توصلوا إليه (Rudol and Scherer, 2001) الذين سجلوا نسبة بلغت 4.8%.

أما بالنسبة لاختبار الحساسية للمضادات الحيوية أعطت جميع العزولات من جراثيم الليستيرية حساسية للصاد الحيوي (البنسيلين). ومن جهة أخرى كانت جميع العزولات مقاومة بنسبة 100% للمضادات الحيوية:

(لينكوميسين، أموكسلين، سولفاسوميديين، ستربتومايسين، كلوكساسلين، سبيكينومايسين، كولستين).

ولقد أكد الباحث (EL-Sherbini *et al.*, 1998) بأن المضادات الحيوية تثبط جراثيم الليستيرية مثل المضاد الحيوي الأمبسلين، والأريثرومايسين، والسلفاميثوكسازول).

وأن جراثيم الليستيرية حساسة لكل من (البنسيلين، والكلورامفينكول، والتراميثريم، والأريثرومايسين، والجنتاميسين، والريفامبسين، والتتراسكلين) ومقاومة للسيفالوسبورينات.

الاستنتاجات والتوصيات

CONCLUSIONS

&

RECOMMENDATION

6- الاستنتاجات والتوصيات:

6-1- الاستنتاجات :

خلصت هذه الدراسة إلى ما يلي:

1- الكشف عن وجود جراثيم الليستيرية و تحديد هويتها في عينات الحليب والأجبان في محافظة دير الزور.
2- إن كل العزولات التي تم التوصل إليها من عينات الحليب والأجبان المأخوذة من محلات البيع في محافظة دير الزور كانت مقاومة للمضادات الحيوية مما يشكل صعوبة في القضاء على هذه الجراثيم عند الحيوانات المصابة حيث أن هذه الجراثيم تطرح عن طريق الحليب ولها القدرة على الانتقال عن طريق الغذاء.

3- إن هذه الجراثيم متحركة ولها القدرة على العيش في الأوساط الغذائية ويمكنها الانتقال عن طريق تلوث الأيدي العاملة أو الأدوات أو الجو المحيط إلى الألبان والأجبان.

6-2- التوصيات:

1- تطبيق الشروط الصحية للأغذية لمنع انتشار الأمراض والحد من وقوع حالات تسمم غذائي أو التهاب سحايا عند الأطفال أو حدوث حالات إجهاض عند النساء الحوامل.

2- غليّ الحليب والأجبان جيداً وذلك لضمان قتل المحتوى الجرثومي وخاصة تلك التي تسبب الأمراض والتسمم الغذائي.

3- تطبيق الشروط التربوية الصحيحة في مزارع الأبقار والأغنام لمنع حدوث انتشار العدوى بجراثيم الليستيرية في المزارع.

4- مراقبة دورية للأسواق المحلية خاصة محلات الحليب الألبان والأجبان وإجراء فحص عينات بشكل دوري للتأكد من سلامة هذه المنتجات وخلوها من الجراثيم وخاصة جراثيم الليستيرية.

5- إجراء المزيد من الأبحاث بهدف معرفة المضادات الحيوية الفعالة في علاج الإصابة بالليستيرية ودراسة قدرة هذه الجراثيم على تطوير مقاومة اتجاه المضادات الحيوية.

المخلص

ABSTRACT

7-1- الملخص العربي:

هدفت هذه الدراسة إلى عزل جراثيم الليستيرية من الحليب والأجبان في محافظة دير الزور حيث تم جمع 120 عينة من الحليب (30 عينة من الأبقار، 30 عينة من الأغنام) و60 عينة من الأجبان (30 عينة من الأبقار، 30 عينة من الأغنام) بشكل عشوائي من أماكن مختلفة مخصصة لبيع الحليب والجبن في محافظة دير الزور، خضعت هذه العينات لإجراءات الزرع الجرثومي بغرض عزل وتحديد هوية جراثيم الليستيرية،

أظهرت نتائج الزرع والعزل الجرثومي والاختبارات الكيميائية عن تحديد هوية 10 عزولات من جراثيم الليستيرية، 4 عزولات من الحليب (3 عزولات من حليب الأبقار، 1 عزولة من حليب الأغنام) وبنسبة 10% و 3.33% على التوالي.

و 6 عزولات من الأجبان (4 عزولات من أجبان الأغنام و2 عزولة من أجبان الأبقار) وبنسبة 13.33% و 6.66% على التوالي.

كما أعطت هذه العزولات حساسية متوسطة للمضاد الحيوي البنسلين وكانت مقاومة لكل من اللينكومايسين، الأموكسلين، السولفاسوميديين، الستربتومايسين، السبيكينومايسين، الكولستين.

إن الكشف عن جراثيم الليستيرية في الحليب والأجبان يشكل خطر على الصحة العامة ويتطلب المزيد من البحث في هذا المجال

الكلمات المفتاحية: الليستيرية، الحليب، الجبن، الأغنام، الأبقار.

7-2- Abstract

This study aimed to isolate *Listeria* bacteria from milk and cheese in Deir ez-Zor Governorate, where 120 samples were collected, 60 samples from milk (30 samples from cows, 30 samples from sheep) and 60 samples from cheese (30 samples from cows, 30 samples from sheep). Randomly from different places designated for selling milk and cheese in Deir ez-Zor Governorate, these samples were subjected to bacterial culture procedures for the purpose of isolating and identifying *Listeria* bacteria.

The results of culture, bacterial isolation, and biochemical tests showed the identification of 10 isolates of *Listeria* bacteria, 4 isolates from milk (3 isolates from cow's milk, 1 isolate from sheep's milk), with a percentage of 10% and 3.33%, respectively.

And 6 isolates from cheese (4 isolates from sheep cheeses and 2 isolates from cow cheeses), with a percentage of 13.33% and 6.66%, respectively.

These isolates also gave medium sensitivity to the antibiotic penicillin and were resistant to Lincomycin, Cloxacillin, Amoxicillin, Sulfasomidne, Streptomycin, Specinomycin, Cholastin.

Detection of *Listeria* bacteria in milk and cheese poses a threat to public health and requires further research in this area .

Key words: *Listeria*; Milk ; Cheeses ;Cheep ; Cow:

المراجع

REFERENCES

8-المراجع العربية والأجنبية:

8-1-المراجع العربية:

1. الرفاعي والعمري (2007): علم الأحياء الدقيقة الخاصة، منشورات جامعة البعث.
2. البني وزملاؤه، (2016): الجراثيم والفيروسات الطبية منشورات جامعة دمشق.
3. شحاتة، عبده (1997): الأمراض الناتجة عن الغذاء المكتبة الأكاديمية – القاهرة (127 -132).

8-2- المراجع الأجنبية:

- 1-Anonymous.(2008):** Microbiology Laboratory Guidebook, Chapter 8, revision 3, 2006; US Department of Agriculture; Accessed: 1 January 2008. Available at : http://www.fsis.usda.gov/Science/Microbiological_Lab_Guidebook
- 2-Baek, S.Y.; Lin, S.y.; Lee, D.; Min, K.H.; Kin, C.(2000):** "Incidence and Characterization of *Listeria monocytogenes* from domestic and imported foods in Korea" J. Food Prot. 63(2):186-189.
- 3-Bell, C. and Kyriakides, A. (2005):** *Listeria, A Practical Approach to the Organism and its Control in Foods*, 2nd Ed. Blackwell Pub., London
- 4-Bennion, JR.; Sorvillo, F; Wise, ME; Krishna, S. and Mascola, L. (2008):** Decreasing listeriosis mortality in the United States, 1990-2005. Clin Infect Dis; 47:867-74.
- 5-Bhunja, A.K. (1997):** Antibodies to *Listeria monocytogenes*. Crit.Rev. Microbiol. 23, 77–107.
- 6-Bubert, A.; Hein, I.; Rauch, M.; Lehner, A.; Yoon, B.; Goebel, W. and Wagner, M. (1999):** Detection and identification of *Listeria* spp. by a single reaction based on multiplex PCR. Appl. Environ. Microbiol. 65, 4688– 4692.
- 7-Center for Disease Control and Prevention (CDC). (2001):** "Epidemiologic Notes and Reports Update Listeriosis and Pasteurized milk" www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwr.html
- 8-Center for Disease Control and Prevention (CDC). (2002):** Multistate outbreak of Listeriosis. MMWR 49 (50), 1129– 1130
- 9-Center for Disease Control CDC, (2006).** Preliminary Food Net data on the incidence of infection with pathogen transmitted commonly through food 10 states, 2006. 56:336-9.

- 10-Chasseignaux,E.;Toquin,MT.;Ragimbeau,C.;Salvat,G.; Colin ,P.and Ermel ,G.(2001):** Molecular epidemiology of *Listeria monocytogenes* isolates collected from the environment , raw meat and raw products in two poultry and pork-processing plants. *J Appl Microbiol*;91: -99.
- 11-Cossart,P.;Pizarro-Cerda, J.andLecuit,M.(2003):** Invasion of mammalian cells by *Listeria monocytogenes* functional mimicry to subvert cellular functions. *Trends Cell Biol.* 13, 23–31.
- 12-Cowan and Steels. (1974):** Manual for the identification of medical bacteria. Second edition revised by S.T.Cowan, Cambridge university press. *Cutis*; 63,25-7
- 13-Cox , L.J. (1989):** A perspective on listeriosis. *Food Technol.*,43, 52–59.
- 14-Cox, L.J.; Kleiss,T.; Cordier, J.L.; Cordellana,C.; Konkel, P. ; Pedrazzini,C.; Beumer, R. and Siebenga, A.(1989):** *Listeria* spp. in food processing, non-food and domestic environments. *Food Microbiology* 6, 49–61.
- 15-Datta, A.R.; Moore,M.A.; Wentz,B.A. and Lane, J.(1993):** Identification and enumeration of *Listeria monocytogenes* by non radioactive DNA probe colony hybridization. *Appl. Environ. Microbiol.* 59:144– 149
- 16-EL-Sherbini , M. ;AL-Agili,S. and Garbaj , A. (1998):** Isolation of *Listeria* from farm milk and abortion cases of women . *Eastern Mediterranean Health,WHO.*4:589-592
- 17-Epidat.(2003):** Occurrence of selected notifiable infections in the Czech Republic during 1999 to 2001 *The Bulletin of Centre of Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health Prague (in Czech)*
- 18-Farber ,J .M . and Peterkin ,P. I. (1991):** *Listeria monocytogenes* , a foodborne pathogen. *Microbiol. Rev.* 55, 476– 511.
- 19-Food and Drug Administration (FDA).(2002) :** “Chapter 10:*Listeria monocytogenes*” www.cfsamfda.gov/ebam/bam-10.html.
- 20-Food Safety and Inspection Service(FSIS).(2000) :** “Action plan for Addressing *Listeria monocytogenes* “ www.fsis.usda.gov
- 21-Fratamico,P.M.;Strobaugh,T.P.;Medina,M.B.andGehring, A.G.(1998):** Detection of *Escherichia coli* O157:H7 using a surface plasmon resonance biosensor. *Biotechnol. Tech.* 12, 571– 576.
- 22-Gava,P.; Saralegui,C.;Medina, M. (1996):** “Occurrence of *Listeria monocytogenes* and other *Listeria* spp in raw caprine milk. “*departamento de tecnologia de alimentos.* 79: (1936 – 1941). **23-Gaya , P.; J. Sanchez . ; , M, Medina & M, Nuñez.(1998):** Incidence of *Listeria monocytogenes* and other *Listeria* species in raw milk produced in Spain. *Food Micr.*

- 24-Gholizadeh ,Y.; Poyart, C. ; Juvin, M. ; Beretti , J., Croize, J.,Berche ,P .andGaillard,J.(1996):** Serodiagnosis of listeriosis based upon detection of antibodies against recombinant truncated forms of listeriolysin O. *J. Clin. Microbiol.* 34, 1391– 1395.
- 25-Graham, JC .;Lanser , S .; Bignardi, G.;Pedler,S.; Hollyoak ,V.;J, Hosp. (2002):** Infect Hospitalacquired listeriosis51:136-.www.ajicjournal.org Vol. 38 No. 9
- 26-Hassan,L.;Mohammed,H.O.;McDomough,P.L.; Gonzalez ,R .N.(2000):**“Acrosssectional Study on the Prevalence of *Listeria monocytogenes* and *Salmonella* in New – York Dairy Herds” *J. Dairy Sci.* 83(11):2441-2447.
- 27-Hiroshi,U.;Keiichi,Y .;Takanori ,A. ;Yasukazu,M.; Hiroyuki ,T.;Takashi,I.;Chiharu,M.(1996):** The prevalence of *Listeria monocytogenes* in the environment of dairy farms. *Microbiol .Immunol.* 40, 121–124.
- 28-Hui, Y. H.;Gorhan, J. E.R.; Murrell, K. D.; Cliver ,D.(1994):** “Foodborne disease handbook–diseases caused by bacteria“ vol. (1), Marcel dekker. Inc. New-York .
- 29-Jay, J.M. (1996):** Foodborne listeriosis, 478–499. In: Jay J. M.(ed.): *Modern Food Microbiology.* Chapman & Hall,New York. 661 pp
- 30-Jensen, N .E.;Aarestrup, F.M .; J. Jensen and H.C .Wegener. (1996):** *Listeria monocytogenes* in bovine mastitis. Possible implication for human health. *International Journal of Food Microbiology,* 32, 209–216.
- 31-Jones,D.(1988):** The place of *Listeria* among gram-positive bacteria. *Infection* 8:85.
- 32-Karpiskovam , R . (1998) :** Study of the occurrence of listeriae in food stuffs in 1998 (in Czech). *The Bulletin of Centre for the Hygiene of Food Chains in Brno,* 7, 8–9 .
- 33-Katell, Rivoal.; Stéphane, Quéguiner.; Evelyne, Boscher.; Stéphanie , Bougeard.; Gwennola, Ermel.; Gilles, Salvat.; Michel, Federighi.; Florence Jugiau, Jocelyne Protais.(2010):** Detection of *Listeria monocytogenes* in raw and pasteurized liquid whole eggs and characterization by PFGE. *International Journal of Food Microbiology* 138 (2010) 56–62
- 34-Koehler, S .; Leimeister-Wächter , M .; Chakraborty , T.; Lottspeich ,F.andGoebel,W.(1990):** The gene coding for protein p60 of *Listeria monocytogenes* and its use as a specific probe for *Listeria monocytogenes*. *Infect. Immun.* 58, 1943– 1950.

- 35-Koneman, E.W.; Allen, S.D.; Janda W.M.; Schreck enberger , P.C. and Winn, W.C (1997).** Color Atlas and Text Book of Diagnostic Microbiology. 5th ed. Lippincott–Raven publisher, Philadelphia, USA. pp. 664-668, 1330.
- 36-Koubova,V.; Brynda, E.; Karasova, L; Skovr ,J.; Homola .,J.; Dostalek , J.; Tobiska , P. and Rosicky , J.(2001):** Detection of food borne pathogens using surface plasmonresonance biosensors. Sens.Actuators, B, Chem. 74, 100– 105.
- 37-Kruszyna T. ;Walsh, M.; Peltekian, K.; Molinari, M. (2008) :** Earlyinvasive *Listeria monocytogenes* infection after orthotopic liver transplantation: casereport and review of the literature. Liver Transpl;14:88-91
- 38-Lemaitre ,J .P.; Echchannaoui, H.; Michaut, G.; Divies, C.; Rousset , A. (1998) :** Plasmid – mediated resistance to antimicrobial agents among listeriae. Food Prot., 61,1459–1464
- 39-Loncarevic,S.;Danielsson,M.L.; Tham, W .(1995):** Occurrence of *Listeria monydogenes* in soft and semis of tcheeseinretailoutlets in Sweden Int. J. Food Micro biology 245-250.
- 40-Makino,S.;Okada,Y,andMaruyama, T. (1995)** A new method for direct detection of *Listeria monocytogenes* from foods by PCR. Appl. Environ. Microbiol. 61, 3745– 3747.
- 41-Marth, E.H and. Ryser, T.E. (1990):** Occurence of *Listeria* in foods milk and dairy foods. 151–164. In Miller A.J. (ed.) Foodborne Listeriosis. Topics in industrial microbiology,Society for industrial Microbiology,A msterdam
- 42-Martins et al.(2010):** Aluster of *Listeria monocytogenes* infections in hospitalized adults.Copyright 2010 by the Associa-tion for Professionals in Infection Control and Epi- demiol-ogy, Inc. Published by Elsevier Inc. All righte rreserved.Am J Infe-ct Control;38:e31-e36
- 43-Mead , P.S.;Slutsker,L.;Dietz,V.(1999):**Food-related illness and death in the United States. Emerg. Infect. Dis. 5, 607– 625.
- 44-Mead, PS. ;Dunne,EF .;Graves,L. ;Wiedmann, M.; Patrick,M. ;HunterS,etal.(2006):**Nationwide outbreak of listeriosis due to contaminated meat. Epidemiol Infect134:744-51.
- 45-Muraoka ,W. ; Gay, C.; Knowles , D. and Borucki , M. (2003) :** Prevalence of *Listeria monosytogenes* Subtypes in Bulk Milk of the Pacific Northwest. Journal of Food Protection , Vol 66 .8 :1413-1419.
- 46-Murray,E.G.D.;Webb,R.AandAwann,M.B.R(1926):** A Qdiseas evofrabbittbcharacterised by alarg monnucellarleucocytosis caused byhithrrtoun described bacillus *Bacterium onocytogenes* . Journal of pathology andBacteriology,29,407-439.

- 47-Office International Epizooties (OIE). (2000):** “Pathogenic micro organisms Milk and Dairy Products the Situation in France and Europe“ 16: 452–471. www.oie.int
- 48-Quinn, P.J.; Markey, B.K.; Carter, M.E.; Donnelly, W.J. and Leonard, F.C. (2006).** Veterinary Microbiology and microbial disease. Printed and bound in Great Britain by international Ltd . Pad stow-Cornwall.
- 49-Radice, C.; Munoz, V .; Castellares ,C.; Casanova, M . ; Serrano, D.; Carrion R, etal.(2006):** Listeria monocytogenes meningitis in two allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Leuk Lymphoma 2006;47:1701-3.
- 50-Regulation by the Ministry of Health No. 91/1999** Collof Laws to amend the regulation by the Ministry of Health No. 294/1997 Coll. of Laws on microbiological requirements for foodstuffs, methods of their control and evaluation (in Czech)
- 51-Rich, R.L. and Myszka, D.G.(2000):** Advances in surface plasmon resonance biosensor analysis. Curr. Opin. Biotechnol. 11, 54– 61.
- 52-Riedo, F.X.; Pinner, R.W.; Tosca, M.; Cartter, M.L.; Graves , L.M.; Reeves, M.W.; Weaver, R.E. ; Plikaytis, B .D.; Broome , C. V. (1994):** A point-source food born listeriosis t break: documented incubation period and possible mild illness. J. Infect. Dis. 170, 693– 696.
- 53-Rocourt, C. and Berche, P.(1996):** The pathogenesis of infection by Listeria monocytogenes. Microbiology SEM 12, 245–258.
- 54-Rocourt, J. and Cossart, P.,(1997):** Listeria monocytogenes. In: Doyle, M.P., Beuchat, L.R., Montville, T.J. (Eds.), Food Microbiology. ASM Press, Washington, DC, pp. 337–352.
- 55-Rodriguez , E.; Arques , J.L.; Gaya, P.; Nunez , M.; Medina , M. (2001):** “Control of Listeria monocytogenes Bacteriocins and Monitoring of Bactriocin Producing Lactic acid Bacteria by Hybridzation in Senni Hard Raw Milk Cheese“ journal of Dairy Research. 68:131-137.
- 56-Ryser, T. E. and Marth, E. (1991):** “Listeria, Listeriosis and food safety“ Marcel dekker Inc. New-York .
- 57-Ryser, T. E. and Marth, E.(1991):** “Listeria, Listeriosis and food safety“ Marcel dekker Inc. New- York .
- 58-Schlegelova, J.; Babak, V.; Klimova, E.; Lukasova, J. ; Navratilova , P. ; Ustackova , A.; Sediva, I. (2002):** Prevalence of and resistance to anti-microbial drugs in selected microbial species isolated from bulk milk samples. VetMed. B., 49, 216–225.

- 59-Sonezaki, S.; Yagi, S.; Ogawa, E. and Kondo, A.(2000):** Analysis of the interaction between monoclonal antibodies and human hemoglobin (native and cross-linked) using a surface plasmon resonance (SPR) biosensor. *J. Immunol. Methods* 238, 99– 106.
- 60-Stepanovic, S.; Lazarevic, M. G. Jesic.; M ,Kos. ;(2004):** Meropenem therapy failure in *Listeria monocytogenes* infection. *Eur J Clin Microbiol Infect*
- 61-Suarez, M.M.; Bautista, RM.; Almela, M.; Soriano, A.; Marco, F.; Bosch J, et al (2007):** *Listeria monocytogenes* bacteria analysis of 110 episodes. *MedClin (Barc)* ;129:218-21.
- 62-Swaminathan, B. and Feng, P.(1994):** Rapid detection of food-borne pathogenic bacteria. *Annu. Rev. Microbiol.* 48, 401– 426.
- 63-Teuber, M. (1999):** Spread of antibiotic resistance with food borne pathogens. *Cell. Mol. Life Sci.*, 56, 755–763.
- 64-Troxler ,R. ;von ,GA. ; Funke, G .;Wiedeman ,B.; Stock ,I .(2000):** Natural antibiotic susceptibility of *Listeria* species : *L.grayi*, *L. innocua* , *L.ivanovii* ,*L.monocytogenes* *L.seeligeri*,and*L.welshimeri* strains.*Clin Microbiol Infect*;6: 525-35.
- 65-van Renterghem,B.;Huysman,F.;Rygole,R.;Verstraete ,W. (1991):** Detection and prevalence of *Listeria monocytogenes* in the agricultural ecosystem. *J. Appl. Bacteriol.* 71, 211 – 217
- 66-Vasavada,PC. (1988):** Pathogenic Bacteria in Milk. A Review. *J.Dairy Sci.*, 71, 2809–2816
- 67-Vazquez – Boland , J.A.;Dominguez,L.;Fernandez-arayzaba l, J .F. and Suarez,G.(1992):** *Listeria monocytogenes* CAMP reaction .*Clin. Microbiol. Rev.* 5, 343.
- 68-Vazquez-Boland , J .A .; Kuhn, M .; Berche ,P.; Chakraborty ,T.; Dominguez – Bernal ,G .; Goebel ,W . ; Gonzalez- Zorn ,B .;Wehland,J.and Kreft,J.(2001):** *Listeria* pathogenesis and molecule Ravlovich, B., 1984. *Listeriosis Research Present Situation and Perspective.* Akademiai Kiado, Budapest.
- 69- VazquezBoland, J .A.; Kocks,C.; Dramsi,S.; Ohayon ,H . ; Geoffroy , C.;Mengaud,J.;Cossart,P.(1992):** Nucleotide sequence of the lecithinase operon of *Listeria monocytogenes* and possible role of lecithinase in cell-to-cell spread. *Infect. Immun.* 60,219– 230
- 70-Vicente,MF.;Perez-Daz,JC.; Baquero ,F., ngeldeP ,M.;Bere nguer , J . (1990) :** Penicillin-binding protein 3 of *Listeria monocytogenes* as the primary lethal target for B-lactams. *Antimicrob Agents Chemother*;34:539-42.

71-Windrantz, P. and Arias, M. L.(2000) : “Evaluation of the Bacteriological Quality of Ice Cream Sold ot San Jose, Costa Rica“ Arch. Latinoem. Nutr. 50 (3) 301-303.

72-Winter,CH.;Brockmann,SO.Sonnentag, SR.; Schaupp,T.; Prager, R.;HH,etal.(2009): Prolonged hospital and community-based listeriosis outbreak caused byready-to-eat scalded sausages. J Hosp Infect;73:121-8