

التهاب أغمدة الأوتار الطاهر

يقصد بذلك التهاب الغشاء الزليلي للوتر والذي يترافق مع التهاب الوتر نفسه

-الأسباب :

تحدث هذه الحالة نتيجة الرضوض أو الإلتواء أو الجزع في الوتر أو الغمد أو كليهما مع بعض وكذلك عن طريق سموم بعض الجراثيم والأمراض المعدية مثل السقاوة أو الأمراض الروماتيزية

ويقسم التهاب الأوتار الطاهر الى نوعين:

أ-التهاب أغمدة الأوتار الحاد : وهذا بدوره ينقسم الى الأنواع التالية:

١-التهاب غمد الوتر الجاف :وفي هذه الحالة يكون غمد الوتر محتقنا وبطائنه ممزقة مما يسبب سماع صوت طقطة عند تحريك الوتر داخل غمده

٢-التهاب غمد الوتر البلاستيكي: يكون هناك ترسبات ليفية نتيجة الالتصاق بين الوتر وغمده

٣-التهاب غمد الوتر المصلي: وهو الشكل الأكثر شيوعا يتصف بزيادة تشكل السائل الزليلي مما يؤدي الى انتفاخ وتورم الغمد

-الاعراض :

تتميز هذه الحالة بوجود أعراض التهاب الحاد الموضعية في منطقة غمد الوتر مع ملاحظة تضخم في غمد الوتر على طوله وقد تحدث فيه احتباسات وتظهر درجات مختلفة من العرج وذلك حسب

المسبب وعند البزل يخرج سائل زليلي ،وبعد حقن المخدر
الموضعي ضمن غمد الوتر يختفي العرج.

الانذار:يكون مواتيا ان عولجت الحالة في الساعات الاولى للاصابة
،ولكن بعد مرور عدة ايام يكون فيه شيء من الاحتراس

العلاج: ١- يجب وضع الحيوان في راحة تامة ووضعه في اسطبل
زي فراش طري كما يمكن تركيب حدوة لها كراسي للمساعدة في
اراحة الغمد والوتر معا

٢- توضع على منطقة الاصابة في الساعات الاولى الكمادات
الباردة والمقبضة

٣- بعد مرور يومين توضع كمادات دافئة بمعدل ٤/٣مرات
يومية

٤- يمكن استعمال مرهم اليود بعد اسبوع من تطبيق الكمادات
الدافئة

٥- يمكن حقن الكورتيزون الجرعة من ٢٠٠/٥٠ملغ حسب
حجم الغمد المصاب مع البنسلين المائي ضمن غمد الوتر
نفسه ثم وضع الرباط حول غمد الوتر وإن دعت الحاجة
يمكن تكرار الحقن بعده ايام ٤/٣ مرات

ب-التهاب اغمدة الاوتار المزمن :

وهو قد يحدث نتيجة الحالة الحادة، وقد يظهر بشكل عفوي دون اي
اسباب ،وقد يلاحظ لدى ممارسة الاعمال الشاقة عند الحيوانات .

-الاعراض: يلاحظ انتفاخ وتورم في غمد او اغمدت الاوتار ، وقد
يكون هذا المؤشر الوحيد للمرض

ويمكن ملاحظة بعض الحرارة الموضعية غير الطبيعية مع قليل من الألم وقد يعرج الحيوان ان كان غمد أحد الاوتار الهامة مصاباً وعند تحسس الغمد قد يلاحظ بعض الاجسام التي تشبه حبيبات الرز تسبح في السائل الزليلي الزائد

-الانذار : إن مثل هذه الحالات التي تظهر عند الحيوانات الفتية دون اسباب واضحة قد تختفي تلقائياً ، بينما تكون الاشكال الاخرى غالباً صعبة العلاج.

-العلاج:

١- تستعمل الاربطة الضاغطة على غمد الوتر بعد وضع كميات كافية من القطن تحت الاربطة لحماية الجلد

٢- يمكن حقن الكورتيوزون مع البنسلين المائي ضمن غمده الوتر بجرعة ٢٠٠/٥٠ ملغ كورتيوزون ثم وضع رباط ويمكن تكرار الجرعة بعد ٤ ايام

٣- يمكن استخدام مضادات تخريش مثل مرهم الحراقة ثم وضع رباط حولها

٤- استعمال الكي الخطي او النقطي

٥- يمكن المشاركة باستعمال الكي في البداية ثم وضع الحراقة ثم رباط حولها

٦-استعمال أدوية انحلا الفيبرين حقناً بالعضل عند وجود ثخانة كبيرة في جدار الغمد