

الالتهاب التقيحي لأغدة الأوتار

هو تجمع صديدي داخل أغدة الاوتار القابضة اعلى مفصل المعقم من الخلف وتكثر الاصابة في القوائم الامامية عند الخيول

الاسباب: تحدث الاصابة نتيجة جرح نافذ في اغمدت الاوتار مع عدوى بالجراثيم او كأحد مضاعفات مسمار الحافر

الاعراض: يلاحظ على الحيوان عرقاً شديداً مع ورم منتشر خلف

مفصل المعقم من الأعلى مع ألم وارتفاع موضعي في درجة

الحرارة وعند ثقب الغمد الوتري يخرج سائل أصفر اللون عكر

يحتوي حبيبات صغيرة كما يسجل ارتفاع في درجات حرارة

الحيوان المصاب تصل الى ٤١م° وبعد بضعة أيام يلاحظ تشكل

عدة خرايرج في المنطقة المصابة ونتيجة لعدم قدرة الحيوان على

تحميل بالقائمة المصابة يضطر الى التحميل بشكل كبير على

القائمة المقابلة مما يسبب التهاب الصفائح الحساسة فيها .

التشخيص: تكون الأعراض واضحة وتكفي للتشخيص

الانذار :يكون موات إن عولجت مباشرة وإن أهملت حتى تتشكل

النواسير وتنتخر الاوتار فتعتبر الحالة غير مواتية او ميأوس منها .

العلاج: يجب علاج مثل هذه الحالات بأسرع ما يمكن وذلك قبل

ظهور الخرايرج وحتى لا تنتخر الاوتار فيخدر الحصان وتحضر

المنطقة للعمل الجراحي من غسيل وحلاقة وتطهير ثم يعمل شق
بالمشرط طوله ٤/٣ سم في المنطقة المحصورة بين السلامية الاولى
والثانية ثم يفتح فوق منطقة العظمين السمسمانية الدانية على جانبي
الوتر القابض السطحي فيخرج السائل الزليلي الخمج من الأغدة
يعمل غسيل بمحلول مطهر من الفتحتين العلويتين ثم يوضع في
الفتحات الثلاث مضادات حيوية مع فتيل شاش لتصريف القيح كما
يعطى الحصان مضادات حيوية عن طريق العضل يوميا حتى
تنخفض الحرارة ويربط مكان العملية ويكرر الغيار كل يومين أو
ثلاثة مع وضع مضاد حيوي وتمتد فترة العلاج إلى حوالي
٦/٤ أسابيع وبعد الشفاء التام يلاحظ وجود تضخم صلب في المنطقة
يعالج بالكي النقطي .