

التهاب العضلات الطاهر

تحدث حالة التهاب العضلات نتيجة عدة اسباب تؤدي الى ارتشاحات داخل نسيج العضلة وزيادة الالم عند الحركة.

١-أما التهاب العضلات الحاد فيقسم الى نوعين:

أ-التهاب العضلات الرضحي: يحدث بسبب الرضوض او الالتواءات او التمزق ، فتبدو العضلات المصابة قاسية وسميكة وساخنة ومؤلمة عند اللمس واذا لم تكن الاصابة شديدة واعطي الحيوان فترة راحة فإنه يشفى سريعاً اما اذا استمرت الخالة دون علاج مدة طويلة فان الألياف العضلية تقصر وتزداد كمية النسيج الليفي وعند اصابة عضلات القوائم يكون العرج من العلامات الواضحة على الحيوان

ب-التهاب العضلات الروماتيزمية: يلاحظ بكثرة في فصل الشتاء نتيجة التعرض لتيارات الهواء البارد فتصاب عضلات الرقبة والظهر والقوائم فتظهر العضلات المصابة مشدودة منقبضة ومؤلمة مع ارتفاع موضعي في درجات الحرارة وعند اصابة القوائم يلاحظ عرج شديد عند سير الحيوان قد يختفي بعد التمرين وغالبا ما تختفي الالام عند الحيوان عدة أيام لتعود مرة أخرى نتيجة تعرضه لتيارات الهواء الباردة

تعالج هذه الإصابة باستخدام كمادات الماء الدافئ مع مروح التربينتين لتنشيط العضلات كما يعطى الحيوان حمض الاستيل سالسيليك عن طرق الفم ويحقن الحيوان بمسكنات الالم مثل النوفالجين كما ينصح بتدليك العضلات المصابة لمنع ضمورها كما يحقن الكورتيزون كمضاد للالتهاب ويمكن تطبيق لبخات

كبريتات المغنيسيوم التي تعمل على الحد من العمليات الالتهابية وعلى نضح وسحب الراشح الالتهابي من داخل العضلات باتجاه سطح الجلد

٢- التهاب العضلات المزمن ويقسم الى ثلاثة أنواع:

أ: التهاب العضلات المزمن التليفي : يحدث هذا النوع من الإلتهابات نتيجة عدم علاج التهاب العضلات الحاد وإهماله اذ يبقى المسبب موجوداً كالرضوض المتكررة وتكون الآلام الموضعية خفيفة وان كانت الإصابة في إحدى القوائم فيلاحظ عرج مختلف الشدة تعالج هذه الحالة بإزالة السبب الأصلي ثم تتابع كما هو عليه في الالتهاب الحاد

ب: التهاب العضلات اليوزونوفيلي المزمن: تلاحظ هذه الحالة عند الكلاب فقط وسببها غير معروف فتصاب العضلات الماضغة والعضلات الجناحية والعضلات الصدغية وأحياناً عضلات القائمتين الأماميتين ويصاب الحيوان أحياناً بالحالة الحادة فتظهر عليه الكآبة وعدم سرور وتقل شهيته للطعام تتضخم العضلات المذكورة سابقاً وتصبح قاسية الملمس ولكن لا يوجد فيها ألم موضعي ولا ارتفاع في درجة الحرارة تجحض العينان للخارج ويبرز الجفن الثالث ولا يستطيع الحيوان فتح فمه إلا بضع سنتيمترات وتستمر هذه الحالة بعض الوقت ثم يظهر الشفاء فجأه ويبقى في حالة طبيعية سليمة مدة ثلاث أسابيع وتعاود الحالة مرة أخرى ثم يشفى ثم تتكرر الحالة عدة مرات فتتحول الحالة الى مزمنة فتضمر العضلات وتتغير ملامح الحيوان وقد يحدث جفاف او تقرحات بالقرنية وتضرب الرؤية عند الحيوان

العلاج : ١- نقل الدم من حيوان من نفس النوع عن طريق الوريد
حوالي ٢٠٠م ٣٠٠سم^٣

٢- حقن ٤٠ ملغ من الكورتيزون يوميا مدة ٥ ايام

٣- استعمال مضادات الهيستامين

٤- تعالج العين بمراهم المضادات الحيوية او مرهم الكورتيزون مع قطرة الازيرين

٥- التهاب العضلات المزمن التكلسي :وهي حالة نادرة عند الحيوانات تشاهد بعد شفاء بعض الحالات الفتاقات او بعد شفاء عمليات فتح البطن ويعتقد ان سبب التكلس هو تحول الخلايا الليفية الى خلايا عظمية تعالج الحالات التي يكون التكلس فيها محدوداً والاستئصال الجراحي أما الحالات التي يكون فيها التكلس منتشراً لا علاج لها.